

Liều Dùng và Cách Dùng*:

Người lớn:

Loại Nhiễm Khuẩn	Liều	Khoảng cách giữa các lần dùng
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp	500 mg	Mỗi 8 giờ
Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da	500 mg	Mỗi 8 giờ
Nhiễm khuẩn sinh dục	500 mg	Mỗi 8 giờ
Nhiễm khuẩn Hô Hấp Dưới		
- Viêm Phổi mắc phải cộng đồng	500 mg	Mỗi 8 giờ
- Viêm Phổi bệnh viện	1 g	Mỗi 8 giờ
Nhiễm khuẩn phúc mạc phức tạp	1 g	Mỗi 8 giờ
Nhiễm trùng máu	1 g	Mỗi 8 giờ
Viêm Màng Não	2 g	Mỗi 8 giờ

Liều dùng cho bệnh nhân suy thận: Cần phải giảm liều cho những bệnh nhân có thanh thải creatinin < 51 mL/phút:

Thanh thải creatinin (mL/phút)	Liều	Khoảng cách giữa các lần dùng
26 - 50	1 đơn vị liều	Mỗi 12 giờ
10 - 25	½ đơn vị liều	Mỗi 12 giờ
< 10	½ đơn vị liều	Mỗi 24 giờ

Liều dùng cho bệnh nhân suy gan: Không phải giảm liều.

Trẻ em từ 3 tháng đến 12 tuổi

Loại Nhiễm Khuẩn	Liều (mg/kg)	Khoảng cách giữa các lần dùng
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp	10	Mỗi 8 giờ
Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da	10 - 20	Mỗi 8 giờ
Viêm Phổi mắc phải cộng đồng	10 - 20	Mỗi 8 giờ
Nhiễm khuẩn phúc mạc phức tạp	20	Mỗi 8 giờ
Viêm Màng Não	40	Mỗi 8 giờ

Trẻ em có thể trọng > 50 kg dùng liều người lớn

* Hướng dẫn sử dụng Meropenem

*Chức vụ
18/04/2013*