


CILZEC

KIỂM SOÁT HUYẾT ÁP HIỆU QUẢ SUỐT 24 GIỜ ⁽¹⁾




Thiết kế nghiên cứu:

- N=812
- Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đơn, nhãn mở, đa trung tâm so sánh hiệu quả hạ áp của Telmisartan 80mg và Ramipril 10mg tại cuối tuần 14 kết thúc nghiên cứu.
- Đối tượng: Bệnh nhân tăng huyết áp từ nhẹ đến trung bình điều trị khởi đầu với Telmisartan 40mg và Ramipril 2.5mg; rồi chỉnh liều Telmisartan 80mg và Ramipril 5mg vào tuần thứ 4 và Telmisartan 80mg và Ramipril 10mg vào tuần thứ 6 của nghiên cứu.
- Thời gian điều trị: 14 tuần

CILZEC

GIẢM PROTEIN NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP KÈM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ⁽²⁾



Thiết kế nghiên cứu:

- N=827
- Nghiên cứu tiền cứu, ngẫu nhiên, mù đôi, nhóm song song đánh giá sự thay đổi tỉ lệ protein/creatinin niệu giữa Telmisartan 80mg và Losartan 100mg
- Đối tượng: Bệnh nhân đái tháo đường kèm tăng huyết áp có bệnh thận rõ rệt
- Thời gian điều trị: 52 tuần