


CILZEC

GIẢM NGUY CƠ TIM MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP KHÔNG DUNG NẠP VỚI ỨC CHẾ MEN CHUYỂN⁽³⁾ (Nghiên cứu Transcend)

Đường cong Kaplan-Meier cho tiêu chí phụ
bao gồm: Tổng hợp nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tử vong do biến cố tim mạch



Thiết kế nghiên cứu:

- N=5926
- Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đơn, đa trung tâm
- Đối tượng: Bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hay đái tháo đường, không có suy tim, có tổn thương cơ quan đích và không dung nạp với thuốc ức chế men chuyển điều trị với Telmisartan 80mg hoặc Giả dược
- Thời gian điều trị: 56 tháng

- Tiêu chí chính: Tổng hợp tử vong do biến cố tim mạch; nhồi máu cơ tim; đột quỵ; suy tim phải nhập viện
- Tiêu chí phụ: Tổng hợp tử vong do biến cố tim mạch; nhồi máu cơ tim; đột quỵ

Tài liệu tham khảo:

1. Yves Lacourcière, et al. A Multicenter, 14-Week Study of Telmisartan and Ramipril in Patients with Mild-to-Moderate Hypertension Using Ambulatory Blood Pressure Monitoring. American Journal of Hypertension 2006; 19:104-112.
2. George Bakris. Telmisartan is more effective than losartan in reducing proteinuria in patients with diabetic nephropathy. Kidney International 2008; 74, 364-369.
3. Salim Yusuf, et al. Effects of the angiotensin-receptor blocker telmisartan on cardiovascular events in high-risk patients intolerant to angiotensin-converting enzyme inhibitors: a randomised controlled trial. Lancet 2008; 372:1174-1183.

[Signature]
9/12/2013

CILZEC

Telmisartan Tablets 20mg/40mg/80mg

