




HIỆU QUẢ HẠ ÁP TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TỪ NHẸ ĐẾN TRUNG BÌNH ⁽¹⁾




Thiết kế nghiên cứu:

- Nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược, nhóm song song
- N= 749
- Đối tượng: Bệnh nhân tăng huyết áp từ nhẹ đến trung bình được phân phối ngẫu nhiên đơn trị liệu với Telmisartan ở các liều 20, 40, 60, 80mg; Hydrochlorothiazide 6.25, 12.5, 25mg hoặc phối hợp giữa Telmisartan và Hydrochlorothiazide ở các khoảng liều kể trên
- Tuổi: 18-80
- Thời gian điều trị: 8 tuần



GIẢM NGUY CƠ MẤT KALI DO LỢI TIỂU ⁽¹⁾



1. Janet B. McGill, et al. Telmisartan Plus Hydrochlorothiazide Versus Telmisartan or Hydrochlorothiazide Monotherapy in patients with Mild to Moderate Hypertension: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Trial. Clin Therapeutics. Vol 23, No. 6, 2001.

9/12/2013