




HIỆU QUẢ HẠ ÁP TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TỪ TRUNG BÌNH ĐẾN NẶNG ⁽²⁾


Thiết kế nghiên cứu:



- Nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, bắt chéo đôi, đối chứng giả dược, nhóm song song
- N=725
- Đối tượng: Bệnh nhân tăng huyết áp từ trung bình đến nặng, sử dụng đơn trị liệu của Telmisartan 80mg, Valsartan 160mg, hoặc giả dược tương ứng tỷ lệ 4 : 4 : 1 tại tuần thứ 4. Và điều trị kết hợp với Telmisartan 80mg/Hydrochlorothiazide 25mg, Valsartan 160mg/Hydrochlorothiazide 25mg, hoặc giả dược, tùy thuộc vào nhóm điều trị ngẫu nhiên ban đầu vào tuần thứ 6 của nghiên cứu. Kết quả được đánh giá sau 8 tuần điều trị
- Thời gian điều trị: 8 tuần



HIỆU QUẢ HẠ ÁP CỦA TELMISARTAN PHỐI HỢP HYDROCHLOROTHIAZIDE SAU 8 TUẦN ĐIỀU TRỊ ⁽²⁾



2. Ravi Marfatia, et al. Effects of Telmisartan with Hydrochlorothiazide versus Valsartan with Hydrochlorothiazide in Patients with Moderate-to-Severe Hypertension. Inter J of Hypertens. Vol 2012.