



Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

BRUFEN[®] suspension

Ibuprofen 100 mg/5ml - Chai 60 ml

Thuốc hạ sốt giảm đau cho trẻ em ⁽¹⁾

- 🍷 Tác dụng hạ sốt nhanh ⁽²⁾
- 🍷 Giảm đau hiệu quả ^(1,3)
- 🍷 Mùi vị cam ⁽¹⁾



*Thư gửi
27/9/13*



THÔNG TIN KẾT TOA

THÀNH PHẦN: Mỗi 5ml (1 muỗng cà phê) chứa 100 mg ibuprofen.

CHỈ ĐỊNH: - Hạ sốt ở trẻ em. - Giảm đau trong các trường hợp như đau răng hoặc

đau do nhổ răng, đau đầu, đau bụng kinh, đau xương và khớp do thấp, đau do bong gân.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Liều khuyến dùng là 20mg/kg/ngày, chia làm nhiều lần.

Người lớn: Dùng giảm đau: 10 ml/lần x 3-4 lần mỗi ngày. **Trẻ em:** Dùng để hạ sốt và giảm đau:

Tuổi	Liều dùng	Số lần
1 - 2 tuổi	2,5ml	3-4 lần/ngày
3 - 7 tuổi	5ml	3-4 lần/ngày