

GIẢM Đ

Panadol®



Không hại dạ dày ✓
Không gây buồn ngủ ✓



GlaxoSmithKline

Thành phần: Paracetamol 500 mg.

Chỉ định: Panadol chứa paracetamol là một chất giảm đau, hạ sốt. Panadol có hiệu quả trong: a) Điều trị đau nhẹ đến vừa bao gồm: Đau đầu, đau nửa đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau họng, đau cơ xương, sốt và đau sau khi tiêm vaccin, đau sau khi nhổ răng hoặc sau các thủ thuật nha khoa, đau răng, đau do viêm xương khớp. b) Hạ sốt.

Liều lượng và cách dùng: **Người lớn (kể cả người cao tuổi) và trẻ em từ 12 tuổi trở lên:** Dùng 500mg đến 1g paracetamol (1-2 viên/lần), sau mỗi 4-6 giờ nếu cần. Chỉ dùng đường uống. Liều tối đa hàng ngày: 4000 mg (8 viên). Không dùng quá liều chỉ định. Không dùng với các thuốc khác có chứa paracetamol. Khoảng cách liều tối thiểu: 4 giờ. **Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi:** Dùng 250-500 mg sau mỗi 4 đến 6 giờ nếu cần. Liều tối đa hàng ngày: 60 mg/kg cân nặng chia thành nhiều lần, mỗi lần 10 - 15 mg/kg cân nặng dùng trong 24 giờ. Không dùng quá liều chỉ định. Không dùng với các thuốc khác có chứa paracetamol. Không dùng quá 4 liều trong 24 giờ. Khoảng cách liều tối thiểu: 4 giờ. Thời gian tối đa dùng thuốc không có tư vấn của bác sỹ: 3 ngày. **Trẻ em dưới 6 tuổi:** Không khuyến cáo dùng thuốc cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Chống chỉ định: Chống chỉ định paracetamol cho những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với paracetamol hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc.

Thận trọng và các lưu ý đặc biệt: Có sự gia tăng nguy cơ gây hại của paracetamol đối với gan trên những bệnh nhân đang bị các bệnh về gan. Những bệnh nhân được chẩn đoán là suy gan hoặc suy thận nên