

Pharmaton®

Kiddi!

chứa
LYSINE
VITAMIN
CANXI



Hỗ trợ phục hồi sau bệnh và Tăng trưởng

BÉ CẦN BỔ SUNG LYSINE VÀ VITAMIN KHI NÀO ?

GIẢI ĐOÀN TĂNG TRƯỞNG



BIỆNG ĂN



PHỤC HỒI SAU BỆNH



SAU PHẪU THUẬT



Boehringer Ingelheim



Thành phần chính: (cho 1ml): Calcium 8,67 mg; Từ Calcium Lactate pentahydrate 66,66mg; Thiamine hydrochloride (Vitamin B1) 0,20mg; Riboflavin sodium phosphate (Vitamin B2) 0,23mg; Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) 0,40mg; Cholecalciferol (Vitamin D3) 0,67mcg (26,67 IU); α -Tocopheryl acetate (Vitamin E) 1,00mg; Nicotinamide (Vitamin PP) 1,33mg; Dexpanthenol 0,67mg; Lysine hydrochloride 20,00 mg. **Chỉ định:** PHARMATON KIDDI syrup đáp ứng nhu cầu gia tăng về vitamin và amino acid thiết yếu lysine, đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng. Thuốc có thể được sử dụng để điều trị phòng ngừa trong trường hợp thiếu vitamin, như ăn kiêng nghiêm ngặt, thời kỳ dưỡng bệnh, giảm ngon miệng, sau ốm, nhiễm khuẩn hoặc phẫu thuật. Trẻ nhỏ từ 1-5 tuổi; 7,5ml mỗi ngày. Trẻ đi học và thanh thiếu niên: 15ml mỗi ngày. Nên uống syrup trong bữa ăn sáng hoặc trưa. PHARMATON KIDDI syrup có thể được pha loãng với nước hoặc thức ăn. Syrup có thể vãi tá được nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Lắc kỹ trước khi dùng. **Thông tin cho bệnh nhân tiểu đường:** thuốc chứa 3,6g carbohydrates cho mỗi liều 15ml. **Chống chỉ định:** Rối loạn chuyển hóa canxi (tăng canxi máu và tăng canxi niệu), quá liều vitamin D, suy thận, sỏi canxi thận, trong thời gian điều trị với vitamin D, Phenylketone niệu. Quà mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Trong các bệnh di truyền di truyền hiếm gặp không dung nạp với một tá được của thuốc thì chống chỉ định dùng thuốc. **Cảnh báo và thận trọng:** Thuốc chứa 2,6g sorbitol cho liều đề nghị tối đa mỗi ngày 15ml. Bệnh nhân với bệnh di truyền hiếm gặp không dung nạp fructose thì không nên dùng thuốc này. **Tương tác:** Vitamin B6 có thể làm giảm hiệu quả của L-Dopa. **Phụ nữ có thai và cho con bú:** Chưa có các nghiên cứu đối chứng ở phụ nữ có thai và cho con bú. PHARMATON KIDDI syrup chỉ được sử dụng trong thời kỳ có thai hoặc cho con bú khi bác sĩ cần nhắc kỹ lợi ích so với nguy cơ. **Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:** Chưa tiến hành nghiên cứu đến ảnh hưởng khả năng lái xe và vận hành máy móc. **Tác dụng phụ:** Rối loạn hệ miễn dịch, da và mô dưới da. Quà mẫn. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản xuất bởi:** Ginsana, SA Via Mullini, CH-6934 Bioggio, THỤY