

Thuốc nhóm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh



CHẾ PHẨM
DÙNG HỖ TRỢ ĐIỀU
TRỊ TRIỆU CHỨNG
CHỦ QUAN BỆNH
VIÊM GAN MẠN TÍNH

CẢI THIỆN HIỆU QUẢ TRIỆU CHỨNG CHỦ QUAN NHƯ: ăn không ngon, cảm giác tức bên phải thượng vị do kém dinh dưỡng (tổn thương gan vì nguyên nhân độc chất - dinh dưỡng) và trong viêm gan mạn tính

Essentiale[®] Forte

Phospholipid đậu nành 300mg



SDK: VN-11314-10

Nguyen
22/10/2013



THÀNH PHẦN: 300 mg phospholipid đậu nành - **DẠNG THUỐC VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY:** Vỉ 10 viên, hộp 5 vỉ. **CHỈ ĐỊNH:** cho bệnh gan nhằm cải thiện các triệu chứng chủ quan, như ăn không ngon, cảm giác tức bên phải thượng vị do kém dinh dưỡng (tổn thương gan vì nguyên nhân độc chất-dinh dưỡng) và trong viêm gan mạn tính. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** dị ứng đã biết với các chế phẩm đậu nành hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. **LIỀU LƯỢNG:** Trẻ em từ 12 tuổi trở lên, người lớn: mỗi ngày 3 lần, lần 2 viên. **CÁCH DÙNG:** uống nguyên viên trong bữa ăn, không nhai, với 1 ly nước. Không hạn chế thời gian dùng thuốc. **THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT:** Nếu triệu chứng trở nặng hoặc có các triệu chứng không rõ ràng khác phải báo cho bác sĩ. Việc điều trị bằng thuốc này không thay thế cho việc tránh các chất độc hại gây tổn thương gan. Trong viêm gan mạn tính, liệu pháp bổ trợ với phospholipid đậu nành chỉ được cân nhắc khi trong thời gian điều trị khi triệu chứng chủ quan được cải thiện. **Trẻ em:** không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi. **Có thai và nuôi con bằng sữa mẹ** không được khuyến dùng trong khi có thai và cho con bú - **Lái xe và sử dụng máy móc:** không có thận trọng đặc biệt. **CÁC TÁC DỤNG PHỤ:** Đôi khi có thể xảy ra các rối loạn tiêu hóa, như đau bụng, phân mềm và tiêu chảy. Rất hiếm khi xảy ra các phản ứng dị ứng như nổi mẩn hoặc phát ban trên da. **Ngưng dùng Essentiale Forte 300 mg** và báo cho bác sĩ biết nếu thấy có tác dụng phụ hoặc nếu tác dụng phụ trở nên nặng hơn, hoặc nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào không được nêu trong tờ hướng dẫn này. **QUÁ LIỀU:** Không có kinh nghiệm về quá liều Essentiale Forte 300 mg. Những tác dụng phụ có thể tăng nặng. Trong trường hợp này, hãy hỏi ý kiến bác sĩ. Nếu quên uống Essentiale Forte: Nếu không uống đủ số viên hoặc nếu quên uống một liều, không được tăng liều gấp đôi trong lần uống kế tiếp, mà tiếp tục uống thuốc theo toa bác sĩ hoặc theo chỉ dẫn trong tờ hướng dẫn này. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** **NHÀ SẢN XUẤT:** A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, D-50829 Cologne, Đức. **Thông tin chi tiết liên hệ:** SanoPI-Aventis Việt Nam. 10 Hàm Nghi, Q.1, TPHCM. Điện thoại: (84.8) 3 8298 526. Chi nhánh Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (84.4) 3 5371 835. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục QLD-BYT:/.../ QLD-TT, ngày .../.../..... In tài liệu .../.../.....

