

aquelette sản phẩm: **Tussistad**

Kích thước (16 x 21 cm)

Hình thức: QUẢNG CÁO THUỐC TRÊN SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ, TỜ RƠI, ÁP PHÍCH, PANO, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG, TRÊN BẢO ĐIỆN TỬ, WEBSITE CỦA DOANH NGHIỆP, WEBSITE CỦA ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ QUẢNG CÁO.



THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN: Mỗi 5 ml sirô chứa: Dextromethorphan HBr...5 mg;

Clorpheniramin maleat...1,33 mg; Glyceryl guaiacolat...50 mg; Amoni clorid...50 mg;

Natri citrat...133 mg; Tã được vừa đủ...5 ml. **CHỈ ĐỊNH:** Sirô Tussistad được dùng để kiểm soát các cơn ho do cảm lạnh, cúm, lao, viêm phế quản, ho gà, sởi, viêm phổi, viêm phổi - phế quản, viêm họng, viêm thanh quản, viêm khí quản, viêm khí phế quản, màng phổi bị kích ứng, hút thuốc lá quá độ, hít phải chất kích ứng, và ho có nguồn gốc tâm sinh. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Sirô Tussistad được dùng bằng đường uống, 3-4 lần/ ngày cách nhau 6 - 8 giờ hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. *Trẻ từ 2-6 tuổi:* 5 ml (1 muỗng cà phê). *Trẻ từ 7-12 tuổi:* 10 ml (2 muỗng cà phê). *Người lớn và trẻ em > 12 tuổi:* 15 ml (1 muỗng canh). **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Rối loạn chức năng gan nặng hay suy thận. Nhiễm toan hô hấp nguyên phát. Suy hô hấp tiến triển. Bệnh nhân đang dùng các thuốc ức chế monoamin oxydase (MAO). Phì đại tuyến tiền liệt. Glaucom góc hẹp. Tắc cổ bàng quang. Bệnh nhân hen suyễn. Trẻ em dưới 2 tuổi. **CẢNH BÁO**

VÀ THẬN TRỌNG: Không nên sử dụng trong trường hợp ho dai dẳng hay mãn tính (do hút thuốc, hen suyễn, khí phế thũng), sử dụng thận trọng ở trẻ em bị dị ứng. Dùng thận trọng cho bệnh nhân bị bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường và bệnh cường giáp. Hỏi ý kiến bác sĩ nếu ho kéo dài hơn 1 tuần, có xu hướng tái diễn hoặc kèm theo sốt cao, phát ban, hoặc đau đầu dai dẳng. **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** *Phụ nữ có thai:* Chưa có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát chặt chẽ trên phụ nữ thời kỳ có thai. Chỉ nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai ở hai quý đầu của thai kỳ trong trường hợp thật cần thiết. Vì nguy cơ xảy ra những phản ứng nghiêm trọng cho thai nhi, không nên dùng vào quý thứ ba của thai kỳ. *Phụ nữ cho con bú:* Chưa biết các thành phần thuốc có phân phối vào sữa mẹ hay không, nhưng thuốc kháng histamin khác đã được phát hiện trong sữa mẹ. Vì những phản ứng phụ nghiêm trọng tiềm ẩn của thuốc kháng histamin có thể ảnh hưởng đến trẻ bú sữa mẹ, nên xem xét việc ngưng dùng thuốc hay ngưng cho con bú. **ẢNH HƯỞNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Thuốc có thể gây buồn ngủ, mất nhanh

nhẹn. Các bệnh nhân dùng thuốc này không nên điều khiển xe, vận hành máy móc hoặc các phương tiện vận chuyển khác. **TÁC DỤNG PHỤ:** *Hệ thần kinh trung ương:* Ngủ gà, an thần, nhìn mờ. *Hệ tiêu hóa:* Khô miệng, buồn nôn, nôn, táo bón, đau thượng vị. *Toàn thân:* Mệt mỏi, chóng mặt.

Tuần hoàn: Nhịp tim nhanh. *Da:* Đỏ bừng, nổi mề đay. *Hô hấp:* Suy hô hấp có thể xảy ra khi dùng liều quá cao. **BẢO QUẢN:** Trong bao bì kín, nơi mát, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 chai x 60 ml. Hộp 1 (chai x 120 ml. **TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Liên Doanh STADA - VIỆT NAM

■ K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 3718 1154 - 3718 2141 Fax: 08. 3718 2140 Email: stada@stada.com.vn

■ 40 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương
Tel: 0650. 3767 470 Fax: 0650. 3767 469 Website: www.stada.com.vn

Phân phối: Công ty TNHH Dược Phẩm Khuông Duy

(WNT) - WNTA Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 3863 2083 (8 lines) Fax: 08. 3977 0850

Website: www.khuongduy.com.vn