

Maquette sản phẩm **Flucoldstad**

Kích thước 120 x 210 mm

Hình thức: QUẢNG CÁO THUỐC TRÊN SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ, TỜ RƠI, ÁP PHÍCH, PANO, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG, TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ, WEBSITE CỦA DOANH NGHIỆP, WEBSITE CỦA ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ QUẢNG CÁO.

Tài liệu dành cho công chúng

Flucoldstad

Paracetamol 500 mg
Cafein 25 mg
Phenylephrin HCl 5 mg

THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén bao phim chứa:
Paracetamol.....500 mg
Cafein.....25 mg
Phenylephrin hydroclorid.....5 mg

CHỈ ĐỊNH
Flucoldstad được dùng để làm giảm đau xoang, các triệu chứng cảm lạnh và cúm, bao gồm cả mệt mỏi và buồn ngủ.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Flucoldstad được dùng bằng đường uống.
Người lớn, trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Mỗi lần dùng từ 1 - 2 viên, có thể tăng lên 4 lần/ ngày (nhưng không quá 8 viên một ngày).
Những liều này không nên lặp lại thường xuyên mỗi 4 giờ.
Không nên dùng liên tục hơn 7 ngày mà không có sự tư vấn về y tế.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
- Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Sử dụng đồng thời với các thuốc thông mũi cường giao cảm khác.
- U tế bào ưa crom.
- Tăng nhãn áp góc đóng.
- Suy gan hoặc suy thận nặng, tăng huyết áp, cường giáp, bệnh tiểu đường, và bệnh tim.
- Bệnh nhân dùng thuốc chống trầm cảm ba vòng, hoặc thuốc chẹn beta.
- Những người đang dùng hoặc những người đã dùng IMAO trong vòng hai tuần qua.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG
Nên dùng thận trọng cho bệnh nhân:
- Bị suy giảm chức năng thận hoặc gan, hay bệnh nhân nghiện rượu.
- Có tiền sử loét dạ dày, tá tràng.
- Loạn nhịp tim, hồi hộp.
- Nhịp tim chậm.
- Phi đại tuyến tiền liệt.
- Xơ cứng động mạch nặng.
- Mạch máu ngoại biên hoặc mạch treo có huyết khối.
- Bệnh nhân nên ngừng sử dụng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng kéo dài hơn 7 ngày hoặc có sốt kèm theo, hoặc nếu lo lắng, chóng mặt, hoặc bị mất ngủ trong thời gian điều trị.
- Dùng thận trọng cho trẻ em và người cao tuổi đối với thuốc có chứa phenylephrin.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
- **Phụ nữ có thai:** Sản phẩm này không được khuyến cáo sử dụng trong thai kỳ do có chứa phenylephrin và cafein. Nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến cafein khi mang thai là trọng lượng trẻ sơ sinh thấp và nguy cơ sẩy thai tự nhiên tăng.
- **Phụ nữ cho con bú:** Cần tư vấn y tế khi sử dụng thuốc này trong thời gian cho con bú vì cafein trong sữa mẹ có thể có tác dụng kích thích trên trẻ sơ sinh bú sữa mẹ và phenylephrin có thể được bài tiết trong sữa mẹ.

ẢNH HƯỞNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
- Bệnh nhân không nên lái xe hay vận hành máy móc nếu thấy bị chóng mặt.

TÁC DỤNG PHỤ
- **Paracetamol:** Các tác dụng phụ của paracetamol hiếm và thường nhẹ, phản ứng huyết học bao gồm giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu trung tính, và mất bạch cầu hạt.
Da phát ban và phản ứng quá mẫn khác đôi khi xảy ra.
- **Cafein:** Mất ngủ, bồn chồn, căng thẳng và mê sảng nhẹ.
- **Phenylephrin:** Tăng huyết áp kéo dài.
Nhịp tim nhanh hoặc phản xạ nhịp tim chậm.

BẢO QUẢN: Trong bao bì kín, nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
ĐÓNG GÓI: Vỉ 10 viên. Hộp 10 vỉ.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Liên Doanh STADA - VIỆT NAM
Phân phối: Công ty TNHH Dược Phẩm Khương Duy
NN1 - NN1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08. 3863 2083 (8 lines) Fax: 08. 3977 0850 Website: www.khuongduy.com.vn

11/10/2018

0404-L.D.N.G
TY
HỮU HẠN
DOANH
VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH