



Rabeprazole - Teva 20 mg

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Hệ cơ quan	Hay gặp	Ít gặp	Hiếm gặp	Rất hiếm gặp	Chưa biết
Nhiễm khuẩn	Nhiễm khuẩn				
Rối loạn máu và hệ bạch huyết			Giảm bạch cầu trung tính. Giảm bạch cầu. Giảm tiểu cầu. Tăng bạch cầu		
Rối loạn hệ miễn dịch			Quá mẫn		
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng			Chán ăn		Giảm natri huyết
Rối loạn tâm thần	Mất ngủ	Lo lắng	Suy nhược		Lú lẫn
Rối loạn hệ thần kinh	Đau đầu, chóng mặt	Buồn ngủ			Phù mạch ngoại biên
Rối loạn mạch					
Rối loạn tại mắt			Rối loạn thị giác		
Rối loạn hô hấp, ngực và trung thất	Ho, viêm họng, Viêm mũi	Viêm phế quản, Viêm xoang			
Rối loạn hệ tiêu hóa	Ỉa chảy, nôn, buồn nôn, đau bụng, táo bón, đầy hơi	Khó tiêu, khô miệng, ợ hơi	Viêm dạ dày, viêm miệng, rối loạn vị giác		
Rối loạn gan-mật			Viêm gan, tắc mật. Bệnh não gan		
Rối loạn da và mô mềm		Hồng ban	Ngứa, đỏ mẩn, nổi mụn nước trên da	Hồng ban đa dạng, hoại tử thượng bì nhiễm độc, hội chứng Stevens-Johnson	Hồng ban đa dạng, hoại tử thượng bì nhiễm độc, hội chứng Stevens-Johnson
Rối loạn cơ xương, mô liên kết và xương	Đau không điển hình, đau lưng	Đau cơ, chuột rút ở chân, đau khớp			
Rối loạn thận và tiết niệu		Nhiễm khuẩn đường tiết niệu	Viêm thận kẽ		
Rối loạn vú và sinh sản					Hội chứng nam có vú nở lớn
Rối loạn toàn thân và phản ứng tại chỗ	Suy nhược, bệnh giống cúm	Đau ngực, ớn lạnh, sốt			
Cận lâm sàng		Tăng men gan (*)	Tăng cân		

(*) Bao gồm sưng mắt, hạ huyết áp và khó thở

(*) Hồng ban, bong nước trên da và các phản ứng quá mẫn thường biến mất sau khi ngừng dùng thuốc.

(*) Đã có báo cáo với tần suất hiếm gặp về bệnh não gan ở bệnh nhân bị xơ gan. Cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân suy gan nặng

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU:

Liều cao nhất đã được sử dụng không vượt quá 60 mg, ngày 2 lần hoặc 160 mg, ngày một lần. Các tác dụng bất lợi gặp phải thường tự biến mất mà không cần can thiệp. Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Rabeprazole natri gắn mạnh với protein huyết tương và do đó, không thể loại khỏi tuần hoàn nhờ thẩm tách. Giống như các trường hợp quá liều khác, khi xảy ra quá liều Rabeprazole, cần điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Bảo quản dưới 25°C, trong bao bì gốc.

ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vỉ x 10 viên.

NHÀ SẢN XUẤT: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
18, Eli Hurvitz St., Ind. Zone, Kfar Saba 44102-Israel