


Cefonen

Ceftriaxone



Kháng sinh tiêm nhóm Cephalosporin thế hệ 3

SĐK: VN-15963-12

CEFONEN: Bột pha tiêm

THÀNH PHẦN:

- Mỗi lọ chứa: Ceftriaxone Sodium USP tương ứng với Ceftriaxone 1000mg.

CHỈ ĐỊNH:

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, nhiễm khuẩn đường niệu, viêm nhiễm vùng chậu, lậu không biến chứng, nhiễm khuẩn da và cấu trúc da, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn xương và khớp, viêm màng não, dự phòng trong phẫu thuật.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Bệnh nhân bị dị ứng với các nhóm cephalosporin.
- Trẻ sơ sinh bị tăng bilirubin huyết, đặc biệt trẻ sinh non không nên điều trị với Cefonen.
- Trên nghiên cứu in vitro cho thấy rằng Ceftriaxone có thể đẩy bilirubin ra khỏi liên kết với albumin huyết thanh và viêm não do bilirubin có thể xảy ra ở những bệnh nhân này.

CẢNH BÁO:

- Thận trọng khi dùng ceftriaxone ở bệnh nhân nhạy cảm với penicillin.
- Ngưng dùng ceftriaxone nếu bệnh nhân có triệu chứng bệnh túi mật.

THẬN TRỌNG:

- Bệnh nhân suy gan kết hợp với suy thận, nếu dùng quá 2g ceftriaxone mỗi ngày thì phải theo dõi chặt chẽ nồng độ thuốc trong huyết thanh.
- Nên theo dõi thời gian prothrombin khi dùng thuốc ở bệnh nhân giảm tổng hợp vitamin K hoặc có dự trữ vitamin K thấp (như bệnh gan mãn tính, kém hấp thu), và dùng thêm vitamin K nếu cần (10mg mỗi tuần).
- Sử dụng ceftriaxone kéo dài có thể dẫn đến tăng sinh vi khuẩn không nhạy cảm.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Rượu: dùng rượu cùng lúc với ceftriaxone có thể gây phản ứng giống disulfiram.

Shuecup
11/1/13