


HIỆU QUẢ HẠ HUYẾT ÁP DUY TRÌ SUỐT 24 GIỜ²


Huyết áp tâm thu 24 giờ sau 8 tuần điều trị



Thiết kế giai thử 4x4, ngẫu nhiên, mù đôi, đa trung tâm, kéo dài 8 tuần huyết áp và nhịp tim được đo mỗi 20 phút, việc theo dõi này bắt đầu lúc 8:00 ± 1 giờ

562 bệnh nhân có huyết áp tâm trương từ 95mmHg - 119mmHg được phân nhóm ngẫu nhiên dùng Telmisartan 0, 20, 40 hoặc 80mg + Amlodipine 0, 2,5, 5, hoặc 10mg.

Tiêu chí đánh giá chính: đánh giá sự thay đổi huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương 24 giờ sau 8 tuần điều trị so với ban đầu



A5: Amlodipine 5mg; T80: Telmisartan 80mg; T40: Telmisartan 40mg; T40/A5: Telmisartan 40mg/Amlodipine 5mg;

T80/A5: Telmisartan 80mg/Amlodipine 5mg

2. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế: xxxx.v.v.Q.L.D-TT, Ngày xx tháng xx năm xxxx
Ngày xx tháng xx năm xxxx in tài liệu

26/12/2013