


(*) Thông tin này chỉ dùng để tham khảo

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế
Tài liệu gồm có 2 trang. Thông tin chi tiết sản phẩm xem trang 2



PHỐI HỢP TELMISARTAN / AMLODIPINE HẠ HUYẾT ÁP HIỆU QUẢ Ở CÁC MỨC ĐỘ TĂNG HUYẾT ÁP^{1*}

Mức hạ huyết áp tâm trương trung bình**




Dữ liệu từ nghiên cứu dò liều, được tiến hành ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng giả dược, đo trung tâm, kéo dài 8 tuần nhằm đánh giá hiệu quả của phối hợp Telmisartan 0, 20, 40, 80mg và amlodipine 0, 2,5, 5, 10mg trên 1461 bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn 1 hoặc 2. Dữ liệu này không bao gồm những bệnh nhân có huyết áp tâm thu ban đầu <140mmHg

** Mức hạ huyết áp đáy khi đo ở tư thế ngồi



DUNG NẠP TỐT 2*



Nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, giả đối, đối chứng giả dược, thiết kế giai thừa 4x4, nhóm song song, điều trị trong 8 tuần nhằm đánh giá hiệu quả và độ an toàn của phối hợp Telmisartan 0, 20, 40, 80mg và Amlodipine 0, 2.5, 5, 10mg trên 1461 bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn 1 hoặc 2

2. Littlejohn TW, et al. Journal of Clinical Hypertension 2009; 11:1-7

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế: xxx/xx/QLD-TT. Ngày xx tháng xx năm xxxx
Ngày xx tháng xx năm xxxx in tài liệu

Boehringer
Ingelheim

26/12/2013