


TWYNSTA
TELISARTAN + AMLODIPINE

HIỆU QUẢ HẠ HUYẾT ÁP DUY TRÌ SUỐT 24 GIỜ¹


Huyết áp tâm thu 24 giờ sau 8 tuần điều trị



Thiết kế giai thừa 4x4, ngẫu nhiên, mù đôi, đa trung tâm, kéo dài 8 tuần huyết áp và nhịp tim được đo mỗi 20 phút, việc theo dõi này bắt đầu lúc 8:00 ± 1 giờ

562 bệnh nhân có huyết áp tâm trương từ 95mmHg - 119mmHg được phân nhóm ngẫu nhiên dùng Telmisartan 0, 20, 40 hoặc 80mg + Amlodipine 0, 2.5, 5, hoặc 10mg.

Tiêu chí đánh giá chính: đánh giá sự thay đổi huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương 24 giờ sau 8 tuần điều trị so với ban đầu



A5: Amlodipine 5mg; T80: Telmisartan 80mg; T40: Telmisartan 40mg; T40/A5: Telmisartan 40mg/Amlodipine 5mg;
T80/A5: Telmisartan 80mg/Amlodipine 5mg

1. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

(*) Thông tin này chỉ dùng để tham khảo