

Pharmaton®

giảm **Căng Thẳng**
bớt **Mệt Mỏi**



Nguyễn
18/10/13



Chỉ **1 viên** / ngày

Thành phần cho mỗi viên: *Pharmaton Capsules*: chiết xuất nhân sâm G115 Pharmaton chuẩn hóa 40mg, 2 Dimethylaminoethanol 26mg, vitamin A 4000IU, vitamin D2 400IU, vitamin E 10mg, vitamin B1 2mg, vitamin B2 2mg, vitamin B6 1mg, vitamin B12 1mcg, calcium pantothenate 10mg, vitamin PP 15mg, vitamin C 60mg, rutoside trihydrate 20mg, fluor 0,2mg, kali 8mg, đồng 1mg, mangan 1mg, magiê 10mg, sắt 10mg, kẽm 1mg, canxi 90,3mg, phospho 70mg, lecithin 66mg. *Pharmaton Fizzi*: chiết xuất nhân sâm G115 Pharmaton chuẩn hóa 40mg, vitamin C 60mg, vitamin E 14,9mg, vitamin PP 18mg, beta caroten 2mg, vitamin D 200IU, vitamin B1 1,4mg, vitamin B2 1,6mg, vitamin B6 2mg, axit folic 0,2mg, biotin 0,15mg, vitamin B12 1mcg, canxi 100mg, magiê 40mg, sắt 10mg, kẽm 1mg, đồng 0,5mg, selen 0,05mg. **Chỉ định:** Trong trường hợp kiệt sức (VD: do stress), mệt mỏi, yếu, giảm khả năng tập trung, tinh thần giảm tỉnh táo. Mất cân bằng, thiếu hụt dinh dưỡng (người cao tuổi, ăn kiêng, chán ăn, mất ngon miệng), suy nhược do các bệnh mạn tính hoặc cấp tính bao gồm phẫu thuật và thời kỳ dưỡng bệnh. **Chống chỉ định:** Những trường hợp bệnh di truyền hiếm gặp, trường hợp rối loạn chuyển hóa canxi (như tăng canxi huyết, canxi niệu), rối loạn thừa vitamin D, đang sử dụng vitamin D, suy thận, mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Ngoài ra, đối với *Pharmaton Capsules*: tăng vitamin A, không dùng khi đang điều trị retinoid (VD: chống mụn), tiền sử dị ứng với lạp, đậu tương. Đối với *Pharmaton Fizzi*: phenylketone niệu. **Liều dùng:** 1 viên mỗi ngày, nên uống vào bữa ăn, thích hợp nhất là vào buổi sáng. Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi, không có liều dùng đặc biệt cho người cao tuổi. Thông tin cho bệnh nhân tiểu đường: 1 viên nang chứa 10 mg carbohydrate, 1 viên sủi chứa 2,48g carbohydrate. *Pharmaton Fizzi*: nên hòa tan vào 1 cốc nước và khuấy đều. **Thận trọng:** *Pharmaton Capsules*: không nên dùng trong những trường hợp bệnh di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, như chứng rối loạn carbohydrate bẩm sinh (galactose huyết). Tá dược ethyl parahydroxy benzoate và propyl parahydroxy benzoate có thể gây dị ứng (có thể muộn). *Pharmaton Fizzi*: bệnh nhân với bệnh di truyền hiếm gặp không dung nạp với fructose thì không dùng thuốc này. **Phụ nữ có thai & cho con bú:** nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chưa có nghiên cứu trên phụ nữ mang thai và khả năng sinh sản ở người. Pharmaton chứa lượng vitamin D và A cao gấp đôi nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. **Tác dụng phụ:** quá mẫn, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban, ngứa. **Nhà sản xuất:** *Pharmaton Capsules*: Swiss Caps AG - Thụy Sĩ, Husenstrasse 35, 9533 Kirchberg. *Pharmaton Fizzi*: E-Pharma Trento S.P.A - Ý, Via Provina 2, 38040 Ravina di Trento. **Xuất xưởng bởi:** Ginsana SA - Thụy Sĩ, Via Mulini 6934 Bioggio.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Boehringer
Ingelheim

7