

CEFIXIME MKP 200

Cefixime 200mg

CÔNG THỨC:

- Viên bao phim: cefixime trihydrate tương đương cefixime 200mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.
- Viên nén: cefixime trihydrate tương đương cefixime 200mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn:

- Đường hô hấp trên và dưới: viêm xoang, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản,...
- Đường tiết niệu và sinh dục: bệnh lậu, viêm bể thận,...
- Đường tiêu hóa: viêm túi mật, thương hàn.
- Da và mô mềm.

CÁCH DÙNG:

Thời gian điều trị thông thường 7 - 14 ngày.

- Người lớn: liều thường dùng 200 - 400mg/ngày, phụ thuộc vào mức độ nhiễm khuẩn, có thể uống 1 lần hoặc chia làm 2 lần cách nhau 12 giờ.
- Trẻ em:

- * Trẻ em > 12 tuổi hoặc cân nặng > 50kg: có thể dùng theo liều của người lớn.
- * Trẻ em 6 tháng - 12 tuổi: 8mg/kg/ngày, uống 1 lần hoặc chia làm 2 lần cách nhau 12 giờ.

- Bệnh lậu không biến chứng: uống 1 liều duy nhất 400mg.
- Bệnh nhân bị suy thận:

Độ thanh thải creatinine	Liều
> 60ml/phút	Không cần điều chỉnh liều
21 - 60ml/phút	300mg/ngày
< 20ml/phút	200mg/ngày

Do cefixime không mất đi qua thẩm phân máu nên những người bệnh chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng không cần bổ sung liều cefixime.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với kháng sinh nhóm cephalosporin, penicillin hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Rối loạn tiêu hóa: thường gặp tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, nôn, đầy hơi, ăn không ngon, viêm đại tràng giả mạc,...
- Hệ thần kinh: đau đầu, chóng mặt, bồn chồn, mất ngủ, mệt mỏi.
- Quá mẫn: ban đỏ, mày đay, sốt do thuốc.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Bệnh nhân bị suy thận, bao gồm cả những bệnh nhân đang lọc máu ngoài thận.
- Bệnh nhân có tiền sử bệnh đường tiêu hóa và viêm đại tràng.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:

- Phụ nữ mang thai chỉ sử dụng cefixime khi thật cần thiết.
- Thận trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú, tạm ngừng cho con bú trong thời gian dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:


- Probenecid: làm tăng nồng độ đỉnh và AUC của cefixime, giảm độ thanh thải của thận và thể tích phân bố của thuốc.
- Các thuốc chống đông máu: làm tăng thời gian prothrombin, có hoặc không kèm theo chảy máu.
- Carbamazepine: làm tăng nồng độ carbamazepine trong huyết tương.
- Nifedipine: làm tăng sinh khả dụng của cefixime.

QUÁ LIỀU:

Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục QLĐ-Bộ Y Tế
XXXX/XX/QLĐ-TT, ngày...tháng...năm...; Ngày...tháng...năm...in tài liệu.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam

ĐT: (84.8) 38650 258, 38650 436 - Fax: (84.8) 38650 394

Email: info@mekophar.com - Website: www.mekophar.com



TP.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2014
DS. Nguyễn Thùy Vân