





Mỗi viên Calcium Sandoz dạng sủi cung cấp 500mg canxi nguyên tố,
với sự kết hợp từ hai thành phần canxi:

Calcium lactat gluconat



Calcium carbonat

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên thuốc: **Calcium Sandoz 500mg**. Thành phần: Cho 1 viên nén sủi bọt: Calcium lactat gluconat 2940mg, Calcium carbonat 300mg, tương đương 500mg nguyên tố canxi. **Dạng bào chế:** Viên nén sủi bọt. **Chỉ định:** Thuốc này chứa canxi. Được dùng trong trường hợp: • Thiếu canxi do nhu cầu tăng cao (sinh trưởng, thai kỳ, cho con bú). • Để điều trị hỗ trợ tình trạng mất canxi ở xương của người lớn tuổi, hoặc sau thời kỳ mãn kinh, hoặc sau khi dùng liệu pháp corticoid, hoặc trong giai đoạn phục hồi vận động sau một thời gian bị bất động kéo dài. **Liều dùng:** Chỉ dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 2 viên/ngày. Trẻ em từ 6-10 tuổi: 1 viên/ngày. **Cách dùng:** Đường uống. Hòa tan viên sủi bọt trong một ly nước. Không được nuốt hoặc nhai viên thuốc. **Tác dụng không mong muốn:** Rất hiếm gặp (xảy ra < 1/10.000 người) gồm: phản ứng dị ứng nghiêm trọng như sưng tấy mắt, môi, lưỡi, và/hoặc họng, có thể gây khó nuốt. Hiếm gặp (xảy ra < 1/1.000 người) gồm: buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, táo bón, đầy hơi, nôn mửa, ngứa, ban đỏ và/hoặc nóng bóng ở da. Không phổ biến (xảy ra < 1/100 người) gồm: nồng độ canxi trong máu cao (tăng canxi huyết) hoặc thải trừ canxi qua đường tiểu nhiều (tăng canxi niệu). **Chống chỉ định:** • Tiền sử dị ứng với một trong các thành phần của thuốc • Tăng canxi huyết • Tăng canxi niệu • Sỏi canxi (sỏi thận), với hóa mô • Bất động lâu ngày kèm tăng canxi huyết và/hoặc tăng canxi niệu. **Thận trọng:** • Bệnh nhân suy thận: cần kiểm tra hàm lượng canxi trong nước tiểu và máu. • Cần phải cân nhắc đến hàm lượng natri (275 mg trong mỗi viên nén sủi bọt) khi sử dụng cho bệnh nhân theo chế độ dinh dưỡng ít natri (ít muối) hoặc không có muối • Cũng nên chờ ít nhất 2 giờ giữa thời điểm uống các chế phẩm thuốc chứa biphosphonat, các cyclin hoặc estramustine với thời điểm uống viên sủi 500mg Calcium Sandoz. **Lưu ý đặc biệt:** Uống quá nhiều canxi có thể gây nguy hiểm. Sản phẩm thuốc này có chứa sucrose, vì vậy không được dùng cho bệnh nhân không dung nạp với fructose, hoặc kém hấp thu glucose và galactose hoặc cho người thiếu hụt enzyme sucrose-isomaltase (các bệnh về chuyển hóa hiếm gặp). **Có thai hoặc cho con bú:** Nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng bất kỳ thuốc nào. Trường hợp thiếu canxi, bác sĩ của bạn có thể kê toa cho bạn thuốc này trong thời gian bạn mang thai hoặc cho con bú.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nhà sản xuất: Novartis Pharma (Pakistan) Ltd., Petaro Road, Jamshoro, Pakistan. **Thông tin chi tiết**

xin liên hệ: VPĐD Zuegg Pharma Pre Ltd. Tầng 5, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 08 3910 2650.

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của cục QLD..., ngày..., tháng..., năm 2014. In tài liệu ngày... tháng... năm.

