



Mình cao hơn,
để mình
giúp bạn!

CALCIUM
corbière



CAO HƠN, CỨNG CẤP HƠN

CALCIUM corbière[®] bổ sung canxi mỗi ngày hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho bé

TÊN THUỐC: Calcium Corbière, **THÀNH PHẦN:** Ông 5ml: 0,55g Calci glucoheptonat, 0,05g Vitamin C, 0,025g Vitamin PP - Ông 10ml: 1,1g Calci glucoheptonat, 0,1g Vitamin C, 0,05g Vitamin PP, khi bị gãy xương sau một thời gian bị bất động kéo dài). Hỗ trợ điều trị loãng xương, phòng ngừa tình trạng giảm khối lượng xương ở giai đoạn tiền và hậu mãn kinh, dùng corticoid, liều và liều dùng: Ông 5ml: Trẻ em: 1-2 ông/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Ông 10ml: Người lớn: 1-2 ông/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Trẻ em: 1 ông/ngày uống vào buổi sáng, do tăng nguy cơ suy thận. Calcium Corbière có chứa Vitamin PP không dùng cho người bệnh gan nặng, loét dạ dày tiền triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng. **TÁC DỤNG PHỤ:** rối loạn tiêu hóa (táo bón, đầy hơi, buồn nôn, nôn), đỏ bừng mắt, cổ, ngứa, cảm giác rất ngứa, buồn hoặc đau nhói ở da. Tác dụng không mong muốn của vitamin C: > 1/1.000 đến < 1/100: Máu, thiếu máu tan huyết, tim mạch; đỏ bừng mắt, suy tim; Thần kinh trung ương; chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi; Dạ dày-ruột: buồn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **THẬN TRỌNG:** Người có calci niệu tăng nhẹ, tổn thương chức năng thận, thuốc chống ung thư, thuốc điều trị HIV, barbiturat, estrophen, rifampicin, hoặc bổ sung sắt. Cần cảnh báo cho bệnh nhân tiểu đường về lượng đường chứa trong Calcium Corbière (2,5g đường/ông 5ml, 5g đường/ông 10ml). Phụ nữ có thai và cho con bú: dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ, được si, hoặc sau khi ngưng thuốc. Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân tăng ở những bệnh nhân ung thư, thiếu hụt men G6PD, thiếu máu, sỏi thận, hoặc bệnh hồng cầu hình liềm, đầy, bệnh túi mật, vàng da hoặc bệnh gan, gút, viêm khớp do gút. Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân tăng ở những bệnh nhân ung thư, thiếu hụt men G6PD, thiếu máu, sỏi thận, hoặc bệnh hồng cầu hình liềm, không gây hại khi dùng liều theo nhu cầu thông thường hàng ngày. Tuy nhiên, người mang thai nên được cung cấp calci bằng chế độ ăn uống đầy đủ. Dùng qua nhiều loại vitamin và calci các chất khoáng khác có thể gây hại cho mẹ và thai nhi. **Độc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** **NHÀ SẢN XUẤT:** Công ty CP DP Sanoth - SyntheLabo VN, 15/6C Đường Văn B. TP HCM. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Sanoth-Aventis, 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM.ĐT: (84 8) 38 29 8526, fax: (84 8) 3914 4801. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký: VN.CAC.14.09.12