



CAO HƠN, CỨNG CẤP HƠN

CALCIUM corbiere bổ sung canxi mỗi ngày hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho bé

TÊN THUỐC: Calcium Corbiere. **THÀNH PHẦN:** Ông 5ml: 0,55g Calci glucoheptonat, 0,05g Vitamin C, 0,025g Vitamin PP - Ông 10ml: 1,1g Calci glucoheptonat, 0,1g Vitamin C, 0,05g Vitamin PP. **CHỈ ĐỊNH:** tình trạng thiếu calci như: chứng còi xương, chề độ ăn thiếu calci, trong thời kỳ nhũ cầu calci cao (trẻ em đang lớn, **PHỤ NỮ mang thai và cho con bú**, giai đoạn phục hồi vận động khi bị gãy xương sau một thời gian bị bất động kéo dài). Hỗ trợ điều trị loãng xương, phòng ngừa tình trạng giảm khoáng hóa xương ở giai đoạn tiền và hậu mãn kinh, dùng corticoid. **LIEU VÀ CÁCH DÙNG:** Ông 5ml: Trẻ em: 1-2 ông/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Ông 10ml: Người lớn: 1-2 ông/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Trẻ em: 1 ông/ngày uống vào buổi sáng. **CHÔNG CHỈ ĐỊNH:** Mãn cảm với thành phần của thuốc; tăng calci huyết; calci niệu; sỏi calci; u ác tính phá hủy xương; loãng xương do bất động lâu ngày; suy tim và suy thận. Tránh dùng liều cao vitamin C ở bệnh nhân suy thận, do tăng nguy cơ suy thận. Calcium Corbiere có chứa vitamin PP không dùng cho người bệnh gan nặng, loét dạ dày tiền triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng. **TÁC DỤNG PHỤ:** rối loạn tiêu hóa (táo bón, đầy hơi, buồn nôn, nôn) do dùng quá liều; buồn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **THẬN TRỌNG:** Người có calci niệu tăng nhẹ, tổn thương chức năng thận, tiền sử sản đường tiết niệu; có tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, vàng da hoặc bệnh gan, ruột, viêm khớp do gout. Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân ung thư, thuốc điều trị HIV, barbiturat, estrogen, fluphenazin, hoặc bổ sung sắt. Cần cảnh báo cho bệnh nhân tiểu đường về lượng đường chứa trong Calcium Corbiere (2,5g đường/ông 5ml, 5g đường/ông 10ml). Phụ nữ có thai và cho con bú: dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ, được si, hoặc gây hại khi dùng liều theo nhu cầu thông thường hàng ngày. Tuy nhiên, người mang thai nên được cung cấp calci bằng chế độ ăn uống đầy đủ. Dùng quá nhiều loại vitamin và calci cùng các chất khoáng khác có thể gây hại cho mẹ và thai nhi. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. NHÀ SẢN XUẤT:** Công ty CP DP Sanoft - Synthelabo VN, 15/6C Đường Văn Bì, Thủ Đức, TP. HCM. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Sanoft-Aventis, 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM.ĐT: (84 8) 38 29 8526, fax: (84 8) 3914 4801, số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục QLD: .../.../QLD-TT, ngày .../.../2014, in tài liệu .../.../..... **Số đăng ký:** VD-19429-13. VN.CAC.14.09.12