

CALCIUM
corbière®

**Mình cao hơn,
để mình
giúp bạn!**



CAO HƠN, CÙNG CẤP HƠN

21/11/14 *AB*

CALCIUM corbière® bổ sung canxi mỗi ngày, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao cho bé



TÊN THUỐC: Calcium Corbière. **THÀNH PHẦN:** Ống 5ml: 0,55g Canxi glucoheptonat, 0,05g Vitamin C, 0,025g Vitamin PP - Ống 10ml: 1,1g Canxi glucoheptonat, 0,1g Vitamin C, 0,05g Vitamin PP. **CHỈ ĐỊNH:** tình trạng thiếu calci như: chứng còi xương, chề độ ăn thiếu calci, trong thời kỳ nhu cầu calci cao (trẻ em đang lớn, phụ nữ mang thai và cho con bú, giai đoạn phục hồi vận động khi bị gãy xương sau một thời gian bị bất động kéo dài). Hồ sơ điều trị loãng xương, phòng ngừa tình trạng giảm khoáng hóa xương ở giai đoạn tiền và hậu mãn kinh, dùng corticoid. **LIỀU VÀ CÁCH DÙNG:** Ống 5ml: Trẻ em: 1-2 ống/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. Ống 10ml: Người lớn: 1-2 ống/ngày uống vào buổi sáng và buổi trưa. **TRẢ EM:** 1 ống/ngày uống vào buổi sáng. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với thành phần của thuốc, tăng huyết áp, calci niệu, sỏi calci, u ác tính phá hủy xương, loãng xương do bất đồng liều ngày, suy tim và suy thận. **TRÁNH DÙNG LIỀU CAO VITAMIN C** ở những người có tình trạng dư acid, xơ gan, bệnh gout, nhiễm toan ống thận, hoặc tiểu hemoglobin kích phát về đêm. **TRÁNH DÙNG LIỀU CAO VITAMIN C** ở bệnh nhân suy thận, do tăng nguy cơ suy thận. Calcium Corbière có chứa vitamin PP không dùng cho người bệnh gan nặng, loét dạ dày tiền triển, xuất huyết động mạch, hạ huyết áp nặng. **TÁC DỤNG PHỤ:** rối loạn tiêu hóa (táo bón, đầy hơi, buồn nôn, nôn), đau đầu, cổ, ngứa, cảm giác rất bỏng, buồn hoặc đau nhói ở da. **Tác dụng không mong muốn của vitamin C:** > 1/100 tăng oxalat niệu. > 1/1.000 đến < 1/100: Máu, thiếu máu tân huyết, tổn thương chức năng thận, tiền sản đường tiết niệu, có tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, vàng da, gan, gút, viêm khớp do gout. **Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân ung thư, thiếu hụt men G6PD, thiếu máu, sỏi thận, hoặc bệnh hồng cầu hình liềm, hoặc sau khi ngưng mạch vành. Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh, chất chống ung thư, HIV, barbiturat, estrogen, fluphenazin, hoặc bổ sung sắt. Cần cảnh báo cho bệnh nhân tiểu đường về lượng đường chứa trong Calcium Corbière (2,5g đường/ống 5ml, 5g đường/ống 10ml). Phụ nữ có thai và cho con bú: dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ, được sĩ. Không dùng liều như các thông tin hàng ngày. Tuy nhiên, người mang thai nên được cung cấp calci bằng chế độ ăn uống đầy đủ. Dùng quá nhiều loại vitamin và calci cùng các chất khoáng khác có thể gây hại cho mẹ và thai nhi. **Liều sử dụng trước khi dùng, NHÀ SẢN XUẤT:** Công ty CP DP Sanoofi - Synhelabo VN, 15/6c Đặng Văn Bù, Thủ Đức, TP HCM. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Sanoofi-Aventis, 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM. ĐT: (84-8) 38 3914 4801. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục QLD: .../QLD-TT, ngày .../.../2014 tại liều .../.../... **Số đăng ký:** VD-19429-13. VN.CAC.14.09.11**

SANOFI