



EXOMUC

Acetylcysteine 200 mg

28/11/2013

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHẤT TIẾT PHẾ QUẢN

THÀNH PHẦN:

Acetylcysteine 200 mg
Tá dược: hương cam S289, aspartame, beta-carotene, sorbitol vừa đủ 1 gói 1g.
Không đường

DẠNG BẢO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Cốm pha dung dịch uống. Hộp 30 gói.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị rối loạn chất tiết phế quản, đặc biệt trong các bệnh phế quản cấp: viêm phế quản cấp và đợt cấp của bệnh phế quản phổi mãn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Đường uống.

Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: 1 gói/lần x 3 lần/ngày.

Trẻ em từ 2 - 7 tuổi: 1 gói/lần x 2 lần/ngày.

Hòa tan cốm trong nửa ly nước trước khi uống. Uống trước hoặc sau bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Trẻ em dưới 2 tuổi. Phenylketone niệu (do có chứa aspartame). Tiền sử hen (nguy cơ phản ứng co thắt phế quản). Quá mẫn với acetylcysteine.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không có dữ liệu để sử dụng an toàn ở phụ nữ có thai và cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không nên dùng đồng thời thuốc ho hoặc thuốc làm giảm bài tiết phế quản trong thời gian điều trị bằng acetylcysteine.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Đã ghi nhận những rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, nôn. Trong trường hợp này nên giảm liều.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có.

BẢO QUẢN - HẠN DÙNG:

Không được dùng quá ngày hết hạn dùng được ghi trên bao bì. Để xa tầm tay trẻ em.

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT: SOPHARTEX

21, rue du Pressoir, 28500 Vernouillet, Pháp

LIỀU LƯỢNG	SÁNG	TRƯA	CHIỀU
Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi			
Trẻ em từ 2 đến 7 tuổi			



Văn phòng đại diện tại TP.HCM
Tầng 4, tòa nhà BROADWAY C, 150 Nguyễn Lương Bằng
Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
Tel : 84. 8. 54 135 188 - Fax: 84. 8. 54 135 185

Văn phòng đại diện tại Hà Nội
Tòa nhà Giảng Võ Lake View, Phòng 202,
Đ10 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel : 84. 4. 37 723 819 - Fax : 84. 4. 37 723 820