



TRÊN PHỤ NỮ MÃN KINH TĂNG HUYẾT ÁP⁽⁴⁾

Nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên mù đôi, sau 2 tuần dùng giả dược, bệnh nhân được điều trị với Lercanidipine 10-20 mg, ngày 1 lần (n=48) hoặc Amlodipine 5-10 mg, ngày 1 lần (n=44). Thời gian dùng thuốc nghiên cứu: 4-8 tuần. Đối tượng nghiên cứu: 92 phụ nữ mãn kinh bị tăng huyết áp tâm thu 150-179 mmHg, huyết áp tâm trương 95-109 mmHg.







(a) Huyết áp theo tuần, (b) Thay đổi huyết áp trung bình so với ban đầu sau 8 tuần.

Mức giảm huyết áp tâm thu



Mức giảm huyết áp tâm trương



(c) thể tích chân (trung bình $\pm$ SD) theo tuần, (d) thay đổi trung bình so với ban đầu vào tuần thứ 8, $p < 0.001$

(4). Lund-Johansen P. et al.: Quantification of leg oedema

in postmenopausal hypertensive patients treated with Lercanidipine or Amlodipine. Journal of Hypertension 2003; 21: 1003-1010

(5) Lynne M. Bang, Therese M. Chapman and Karen L. Goa: Lercanidipine, A review of its Efficacy in the Management of Hypertension; Drug 2003; 63 (22): 2449-2472