

BIOFLORA®

Saccharomyces boulardii đông khô



Uống cùng lúc



HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP


Phân tích gộp: *S. boulardii* trong điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em⁽²⁾

- >> 7 nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng
- >> 944 bệnh nhi bị tiêu chảy cấp (2 tháng - 12 tuổi)
- >> Tiêu chí đánh giá: thời gian tiêu chảy trung bình

N/A
14/3/2014

S. boulardii giảm **1,1 NGÀY** tiêu chảy

S. boulardii giảm đáng kể tần suất bệnh nhân tiêu chảy sau 2 đến 3 ngày điều trị⁽³⁾



Sau 3 ngày điều trị, tần suất bệnh nhân tiêu chảy ở nhóm dùng *S. boulardii* giảm đáng kể so với nhóm dùng giả dược, khi xét tất cả các bệnh nhân ($p=0.001$) và nhóm bệnh nhân tiêu chảy do Rotavirus ($p=0.0014$)

- Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, đa trung tâm, có đối chứng
- N= 186 (6-48 tháng tuổi)
- Bệnh nhi bị tiêu chảy cấp nhập viện trong vòng 72h
- Liều *S. boulardii*: 200mg/ngày trong 5 ngày