

BIOFLORA®

Saccharomyces boulardii đông khô



2 kháng sinh
+ 1 PPI

HIỆU QUẢ TRONG TIÊU CHẢY DO DÙNG KHÁNG SINH

Phân tích gộp: Hiệu quả của việc bổ sung *S. boulardii* trên tỷ lệ tiết trừ *H. pylori* và tác dụng phụ trong thời gian điều trị⁽⁴⁾

- >> 5 nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, so sánh giả dược
- >> 1307 bệnh nhân trẻ em và người lớn sử dụng phác đồ tiết trừ *H. pylori*
- >> Tiêu chí đánh giá: tỷ lệ tiết trừ *H. pylori* và tác dụng phụ tiêu chảy

NA
14/3/2014

S. boulardii

- ↑ **9%** tỷ lệ tiết trừ *H. pylori*
- ↓ **53%** nguy cơ tiêu chảy do phác đồ tiết trừ *H. pylori*

Kháng sinh


Phân tích gộp: *S. boulardii* ở bệnh nhân người lớn⁽⁵⁾

- >> 10 nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, so sánh giả dược
- >> 1869 bệnh nhân tiêu chảy do dùng kháng sinh đơn thuần và do phác đồ tiết trừ *H. pylori*
- >> Tiêu chí đánh giá: tác dụng phụ tiêu chảy

S. boulardii

- ↓ **53%** nguy cơ tiêu chảy do sử dụng kháng sinh

***S. boulardii* giảm nguy cơ tiêu chảy do dùng kháng sinh (tiêu chảy do *C. difficile* và các loại tiêu chảy khác)⁽⁶⁾**



- Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng
- N= 269 (6 tháng đến 14 tuổi)
- Bệnh nhi bị viêm tai giữa và/hoặc nhiễm trùng hô hấp được điều trị bằng kháng sinh (Amoxicillin + Clavulanate/ Cefuroxime/Clarithromycin/Roxithromycin...)
- Thời gian đánh giá: trong suốt thời gian điều trị và 2 tuần sau khi ngưng điều trị