

Thuốc bán theo đơn

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

enzym ở microsom thể gan, có thể làm tăng tính độc hại của paracetamol do tăng chuyển hóa thuốc thành những chất độc hại với gan.

- Ngoài ra, dùng đồng thời isoniazide với paracetamol cũng có thể dẫn đến tăng nguy cơ độc tính với gan, nhưng chưa xác định được cơ chế chính xác tương tác này. Nguy cơ paracetamol gây độc tính gan gia tăng đáng kể ở người bệnh uống liều paracetamol lớn hơn liều khuyến dùng trong khi đang dùng thuốc chống co giật hoặc isoniazide. Thường không cần giảm liều ở người bệnh dùng đồng thời liều điều trị paracetamol và thuốc chống co giật; tuy vậy, người bệnh phải hạn chế tự dùng paracetamol khi đang dùng thuốc chống co giật hay isoniazide.
- Codeine làm giảm chuyển hóa cyclosporin do ức chế men cytochrom P450.
- Sử dụng đồng thời chất chống tiết cholin với codeine có thể gây liệt tắc ruột.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thời kỳ mang thai: Không dùng cho người mang thai.

Thời kỳ cho con bú: Không dùng cho người cho con bú, vì tính an toàn của thuốc không được xác nhận. Có vài trường hợp nhược tương và tạm ngưng cho bú xảy ra ở các phụ nữ bú sữa của người mẹ đã dùng codeine trên liều điều trị.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Vì thuốc gây ngủ gà, làm giảm sự nhanh lẹ hay tính trí, nên các người lái xe và vận hành máy móc phải cảnh giác khi dùng thuốc.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN (ADR): Nếu dùng liều cao codeine sẽ xảy ra tất cả các bất lợi của morphine, kể cả suy giảm hô hấp, nguy cơ lệ thuốc thuốc. Ban đầu và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đỏ hoặc mề đay, nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và tương tác nhiễm mề đay. Người bệnh mẫn cảm với salicylate mẫn cảm với paracetamol và những thuốc có liên quan. Trong một số ít trường hợp riêng lẻ, paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu. **ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100:** Đau. Đau đầu - buồn nôn, nôn. Huyết học: Loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu), thiếu máu. Thận: Bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000: Khác: Phản ứng quá mẫn.

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ ADR: Nếu xảy ra những tác dụng không mong muốn nghiêm trọng, ngưng dùng paracetamol.

QUA LIỀU: Các bước lần lượt tiến hành: Rửa dạ dày ngay hoặc gây nôn bằng xiro Ipecac - Chỉ định chất giải độc paracetamol càng sớm càng tốt và chất giải độc codeine - Tái lập sự trao đổi hô hấp (dùng ống khí) và thực hiện biện pháp hỗ trợ (khí oxy, dịch truyền tĩnh mạch, chất vasopressin... cũng có thể được dùng) tùy trường hợp.

ĐÓNG GÓI: Hộp 4 vỉ xé và 25 vỉ; vỉ 4 viên. / Hộp 1 tube; tube 10 viên.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C. Tránh ánh sáng.

TİEU CHUẨN ẮP DỤNG: TCCS.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

SỐ ĐĂNG KÝ:

SAVIPAMOL CODEINE: VD-20811-14

SAVIPAMOL CODEINE EXTRA: VD-20812-14

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

Thuốc bán theo đơn

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Savi PAMOL CODEINE

Paracetamol 500 mg
Codeine phosphate 30 mg

Savi PAMOL CODEINE EXTRA

Paracetamol 650 mg
Codeine phosphate 30 mg

ĐIỀU TRỊ CÁC CHỨNG:

» NHUẾ ĐẦU, NHUẾ RĂNG, ĐAU NHUẾ BẮP THỊT

» ĐAU KINH NGUYẾT, ĐAU ĐO GIẢN THƯƠNG

HOẶC PHẪU THUẬT



Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế: ngày
Thông tin sản phẩm: Xem tiếp trang 02, 03, 04.
Ngày in tài liệu:

28/12/2014



THÁCH NIỆM THỜI VẠN


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI (SaviPharm)
Đo Z.01-02-03A KCN trong KCX Tân Thuận, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3 7700 142 / 143 / 144 Fax: (84.8) 3 7700 145
Website: www.savipharma.com.vn Email: svp@savipharma.com.vn

CHI NHÁNH 2: Gian K13-K14, TTMT
DƯỢC PHAM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
134/7 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 224 193 27 - 386 247 96
Fax: (84.8) 386 247 97

CHI NHÁNH HÀ NỘI:
Nhà số 133B, Ngõ 562, Đường Láng,
P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 627 66 717 / 718
Fax: (84.4) 627 66 719

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2014

P.TGD (KH-CN)



ĐS. NGUYỄN HỮU MINH