



Bactroban®

Ointment (mupirocin 2%)

- Được chỉ định trong nhiều trường hợp:¹

Điều trị nhiễm khuẩn da tiên phát ¹

Điều trị nhiễm khuẩn da thứ phát ¹

Signature

08/01/2014

Chốc loét



Vết thương nhiễm khuẩn


Signature

08/01/2014

Chốc



Chàm bội nhiễm



Nhot



Bong nhọt nhiễm khuẩn



Viêm nang lông



Dự phòng vết rạch nhiễm khuẩn

Bactroban® Bôi 2 - 3 lần/ngày, tối đa trong 10 ngày

Ointment (mupirocin 2%)

Tác dụng không mong muốn ⁽¹⁾: Phổ biến (Tỉ lệ xảy ra trong khoảng 1% – ít hơn 10% bệnh nhân): nóng rát tại nơi bôi thuốc. Không phổ biến (Tỉ lệ xảy ra trong khoảng 0,1% - ít hơn 1% bệnh nhân): ngứa, đỏ da, cảm giác châm chích và khô da tại nơi bôi thuốc. Phản ứng da do nhạy cảm với mupirocin hoặc với tá dược. Rất hiếm (Tỉ lệ xảy ra ít hơn 1/10.000 bệnh nhân): đã có báo cáo phản ứng dị ứng toàn thân khi dùng thuốc mỡ mupirocin.

⁽¹⁾ Thông tin kê toa.