

VIÊN TRÁNH THAI KẾT HỢP MARVELON NAY ĐÃ CÓ HỘP 3 vỉ

20/4/14

Dùng và cách dùng: Uống viên đầu tiên của vỉ thứ nhất vào ngày đầu tiên thấy kinh và uống tiếp mỗi ngày 1 viên vào khoảng thời gian
u khi uống viên thuốc cuối cùng và có thể chưa hết ra máu cho đến khi bắt đầu vỉ thuốc mới tiếp theo. Sau khi sinh nếu bạn không cho
n nên bắt đầu ngay vỉ Marvelon mới vào ngày kế tiếp ngày bạn uống viên thuốc cuối cùng của vỉ Marvelon cũ và tiếp tục uống các viên
ngày sau khi ngưng thuốc. Bắt đầu uống vỉ thuốc mới sau 7 ngày ngưng thuốc mà không quan tâm đến kinh nguyệt của bạn đã đến hay
khác sang dùng Marvelon: Chưa dùng biện pháp tránh thai chứa nội tiết tố nào (trong tháng trước đó): Bắt đầu uống thuốc vào ngày
biện pháp tránh thai khác (thuốc viên tránh thai phối hợp (TVTTPH) khác, vòng tránh thai hoặc miếng dán tránh thai) sang dùng Marvelon:
dùng vòng tránh thai hoặc miếng dán tránh thai, tốt nhất nên bắt đầu dùng Marvelon ngay sau ngày tháo vòng tránh thai hoặc miếng
ắc quên uống thuốc: Nếu quên uống 1 viên thì uống 1 viên ngay sau khi nhớ ra. Viên kế tiếp uống vào giờ thường lệ. Nếu quên dưới 12
bắt đầu hành kinh. **6. Thai kỳ và cho con bú:** Không dùng cho người đang mang thai hoặc nghi ngờ có thai. Thuốc ngừa thai có chứa
dùng không mong muốn: Thường gặp (ADR > 1/100): trầm cảm, thay đổi tính tình, đau đầu, buồn nôn, đau bụng, đau vú, căng tức vú,
m gặp (ADR ≤ 1/1000): quá mẫn, tăng ham muốn tình dục, không dung nạp kính áp tròng, ban đỏ, ban đỏ đa hình, tiết dịch âm đạo, tiết
ối, nhồi máu cơ tim) hoặc tai biến mạch máu não. Bệnh lý hoặc tiền sử có tiền chứng huyết khối (cơn thoáng thiếu máu não cục bộ, đau
Protein C hoạt hóa, thiếu antithrombin III, thiếu protein C, thiếu protein S, tăng homocystein trong máu và các kháng thể kháng
ếu tố nguy cơ trầm trọng hoặc nhiều yếu tố nguy cơ huyết khối tĩnh mạch/động mạch. Viêm tụy hoặc có tiền sử liên quan đến tăng
steroid sinh dục (như các cơ quan sinh dục hoặc vú). Xuất huyết âm đạo không rõ nguyên nhân. Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
đột quy, huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc mạch phổi. Sử dụng bất kỳ thuốc tránh thai kết hợp dạng uống nào cũng gây tăng
mạch máu khác như động/tĩnh mạch gan, mạc treo, thận, não, võng mạc. Các triệu chứng của huyết khối/tắc mạch do huyết khối ở
ra tay trái; khó thở đột ngột; ho khởi phát đột ngột, nhức đầu nhiều, khác thường và kéo dài, đột ngột mất hoàn toàn hoặc một phần thị
hoặc một phần cơ thể; rối loạn vận động; đau bụng cấp. Nguy cơ tắc mạch do huyết khối ở tĩnh/động mạch, tai biến mạch máu não tăng
ất động lâu ngày, đại phẫu/phẫu thuật ở chân, chấn thương lớn, và cũng có thể bị viêm tĩnh mạch ở bề mặt và giãn tĩnh mạch. Các tình
uyết, viêm đại tràng mạn tính và thiếu máu hồng cầu hình liềm tăng lên khi dùng TVTTPH
h và hiếm hơn nữa là u ác tính, đã được báo cáo trên người dùng TVTTPH.
yết áp có thể tăng nhẹ khi dùng khi dùng TVTTPH. Rối loạn chức năng gan
nhân có tiền sử nám mặt, nên tránh ánh sáng mặt trời khi đang dùng thuốc.
thêm trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

