1. Tên thuốc: MARVELON/viên nén. **2. Hàm lượng:** 0.15mg Desogestrel và 0.03mg Ethinylestradiol/viên. **3. Chỉ định:** Tránh thai nhất định trong 21 ngày liên tiếp. Sau khi nghỉ 7 ngày không dùng thuốc, bắt đầu uống sang vỉ kế tiếp. Thông thường vào ngày t con bú có thể bắt đầu uống thuốc ngay. Trong trường hợp này, không cần dùng biện pháp ngừa thai bổ sung. Nếu bạn muốn dời thuốc của vỉ này như đã hướng dẫn. Khi bạn muốn có kinh trở lại, hãy ngừng uống thuốc. Kinh nguyệt của bạn sẽ xuất hiện trong v chưa. Nếu bạn muốn có thai, bạn nên ngưng uống thuốc Marvelon và bạn có thể có thai kể từ giờ phút này. ***Chuyển từ biện pháp*** đầu tiên có kinh. Có thể uống vào ngày thứ 2-5 nhưng cần sử dụng thêm biện pháp màng chắn trong 7 ngày đầu dùng thuốc. *Ch* Tốt nhất nên bắt đầu dùng Marvelon ngay sau khi uống viên thuốc mà người phụ nữ đang dùng. Trong trường hợp người phụ n dán tránh thai. Sau khi sảy thai 3 tháng đầu có thể dùng Marvelon ngay lập tức mà không cần dùng biện pháp tránh thai nào. **5. B** giờ: tác dụng ngừa thai vẫn tốt. Nếu quên quá 12 giờ: Cần dùng thêm biện pháp ngừa thai bổ sung trong 7 ngày đầu hoặc cho estrogen/progestogen có thể ảnh hưởng thành phần của sữa mẹ và giảm tiết sữa. Một lượng hoạt chất có thể bài tiết vào sữa m tăng cân. *Ít gặp (1/1000<ADR≤ 1/100):* giữ nước, giảm ham muốn tình dục, đau nửa đầu, nôn, tiêu chảy, nổi ban, mày đay, vú to th dịch vú, giảm cân. **8. Chống chỉ định:** Bệnh lý hoặc tiền sử có huyết khối/tắc tĩnh/động mạch (như huyết khối tĩnh mạch sâu, tắc thắt ngực). Đã biết có những yếu tố có khuynh hướng gây huyết khối tĩnh/động mạch có/không liên quan đến di truyền nh phospholipid (kháng thể kháng cardiolipin, lupus chống đông). Tiền sử đau nửa đầu. Tiểu đường có tổn thương mạch máu .C triglycerin máu. Bệnh lý gan với chức năng gan bất thường u gan (lành hoặc ác tính). Đã biết hoặc nghi ngờ u ác tính chịu ảnh hưở **9. Cảnh báo và thận trọng:** ***1. Rối loạn tuần hoàn:*** Hiếm khi xảy ra tăng nguy cơ bệnh huyết khối động/tĩnh mạch như nhồi máu nguy cơ tắc tĩnh mạch do huyết khối biểu hiện như tắc tĩnh mạch sâu và/hoặc tắc mạch phổi. Rất hiếm khi xuất hiện huyết kh tĩnh/động mạch hoặc tai biến mạch máu não bao gồm: đau và/hoặc sưng một chân; đau dữ dội đột ngột ở ngực kèm/không kèm lực; song thị nói líu lưỡi hoặc không nói được; chóng mặt, ngất kèm/không kèm co giật cục bộ; yếu cơ/mất cảm giác đột ngột ở m lên với: tuổi tăng, hút thuốc, có tiền sử gia đình, thừa cân, rối loạn lipoprotein máu, tăng huyết áp, đau nửa đầu,bệnh van tim,run trạng bệnh lí khác kết hợp với các tai biến tuần hoàn bất lợi bao gồm:tiểu đường, lupus ban đỏ hệ thống, hội chứng tăng urê máu .***2. U bướu:*** Sử dụng kéo dài TVTTPH có thể đóng góp tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung, ung thư vú. Một số hiếm trường hợp u gan ***3. Các tình trạng khác:*** Phụ nữ bị tăng triglycerid máu hoặc có tiền sử gia đình như thế có thể tăng nguy cơ viêm tụy khi dùng TVT cấp hoặc mạn tính cần ngưng dùng TVTTPH. Thận trọng với người không dung nạp galactose. Nám da có thể xảy ra, đặc biệt là trẻ Trước khi dùng Marvelon nên hỏi kỹ tiền sử y khoa và phải loại trừ có thai. Nên đo huyết áp và khám thực thể. **Các thông tin khác x**

Nhà sản xuất: N. V. Organon. Kloosterstraal 6, 5349 AB Oss, The Netherlands.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược: …../…/QLD-TT, Ngày .....tháng .....năm.....

Ngày in tài liệu, xx/xx/xx

Code: MAR-CON-1309021