

khoảng thời gian khác nhau dao động từ dưới 1 tuần - 13 tuần. Tỷ lệ tác dụng không mong muốn đã được báo cáo. Phổ biến ($\geq 1/100$ đến $<1/10$): buồn ngủ, ho, sốt. Không phổ biến ($\geq 1/1000$ đến $<1/100$): đau đầu. Lưu ý rằng ngay cả khi có dữ liệu lâm sàng được trình bày trong phần này ở trẻ 6 tháng - 12 tuổi vẫn không có đủ dữ liệu để hỗ trợ việc sử dụng thuốc này cho như nhi và trẻ < 2 tuổi. **Dữ liệu sau khi lưu hành thuốc:** Ngoài những tác dụng không mong muốn được báo cáo trong quá trình nghiên cứu lâm sàng đã liệt kê trên đây, một số tác dụng không mong muốn rất hiếm gặp đã được báo cáo sau khi sản phẩm lưu hành trên thị trường. Không biết (không thể ước lượng từ dữ liệu có sẵn): quá mẫn kể cả phản ứng phản vệ, tăng cân, tăng cảm giác thèm ăn, hưng hăng, lo âu, ảo giác, trầm cảm, mất ngủ, ý định tự tử, co giật, cảm giác khác thường, choáng váng, ngất, run rẩy, rối loạn vị giác, rối loạn thị giác, nhìn mờ, chóng mặt, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, khó thở, buồn nôn, nôn, viêm gan, xét nghiệm chức năng gan bất thường, phù thận kinh mạch, hồng ban sắc tố cổ định, ngứa, phát ban, mày đay, đau cơ, tiểu khó, bí tiểu, phù. **Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**

QUẢ LIỆU: Triệu chứng và dấu hiệu: Có thể bao gồm ngủ gà ở người lớn; ở trẻ em là lo âu và bồn chồn, bứt rứt sau đó là ngủ gà. **Xử trí:** Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu đối với levocetirizine. Nếu xảy ra quá liều, điều trị triệu chứng hoặc điều trị hỗ trợ được khuyến cáo. Thăm tách máu không có hiệu quả trong việc thải loại levocetirizine.

SẢN XUẤT BỞI: UCB Farchim SA, Z.I de Planchy, Chemin de Croix - Blanche 10, CH-1630 Bulle, Thụy Sĩ.

ĐÓNG GÓI BỞI: UCB Pharma S.p.A, Via Praglia 15, 10044 Pianezza (TO), Ý.

PHÂN PHỐI BỞI: Công ty Cổ phần Dược liệu TU2 (Phytopharma), số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

API XYZTAB 1212-02/151012

Tài liệu tham khảo:

- (*) P.C. Potter, Allergy 2003; 58: 893 - 899

- (**) Thông tin kê toa

Xyzal
Levocetirizine dihydrochloride 5mg

✧ Uống ngày 1 lần duy nhất
✧ Cải thiện đáng kể triệu chứng viêm mũi dị ứng kể cả nghẹt mũi^(**)
✧ Không sử dụng cho trẻ từ 6 - 11 tuổi bị suy thận.



Xyzal
Levocetirizine dihydrochloride 5mg

gsk



Bạn bị Viêm Mũi Dị Ứng?

(Hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, ngứa mắt...)

✧ Uống ngày 1 lần duy nhất
✧ Cải thiện đáng kể triệu chứng viêm mũi dị ứng kể cả nghẹt mũi^(**)
✧ Không sử dụng cho trẻ từ 6 - 11 tuổi bị suy thận.

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý Dược
xxxxxx/QLD-TT ngày xx tháng xx năm xxxx
Ngày xx tháng xx năm xxxx in tài liệu.

Tài liệu này gồm 6 trang, thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở trang 2-5

Thông tin chi tiết xin xem trong hướng dẫn sử dụng thuốc.
Vui lòng thông báo các tác dụng ngoài ý của thuốc về VPĐD của GSK Pte. Ltd. hoặc số điện thoại 0963905235, hoặc email antoanthuoc@gsk.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GLAXOSMITHKLINE Pte Ltd.

TP. Hồ Chí Minh: Lầu 7, P.701, Cao Ốc Metroplitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1
Tel: (84-8) 3824 8744 - Fax: (84-8) 3824 8742

TP. Hà Nội: Lầu 7, P.704, Hà Nội Tower, 49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm
Tel: (84-4) 3936 2607 - Fax (84-4) 3936 2608