



BUDESONIDE + FORMOTEROL Formonide

Ống hít định liều chứa Budesonide/Formoterol fumarate
100 mcg/6 mcg, 200 mcg/6 mcg, 400 mcg/6 mcg

LIỆU PHÁP CẢI THIỆN CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ LÀM GIẢM CÁC ĐỢT KỊCH PHÁT HEN SUYỄN⁽¹⁾

Sự kết hợp của 2 đơn chất formoterol và budesonide

- Các chất này có những phương thức tác động khác nhau và cho thấy có tác động cộng hợp làm giảm các đợt kịch phát hen (suyễn)⁽²⁾
- Không có dấu hiệu về sự suy giảm tác động điều trị Hen khi dùng kéo dài⁽³⁾

✓ Chỉ định:

Formonide Inhaler được chỉ định trong điều trị dài hạn bệnh hen (suyễn) cho bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên khi dạng kết hợp giữa corticosteroid dạng hít và chất chủ vận beta-2 tác dụng kéo dài là thích hợp. Thuốc thuộc nhóm chất chủ vận beta có tác dụng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tử vong liên quan đến hen phế quản, Formoterol kết hợp với budesonide dạng hít chỉ nên sử dụng trong trường hợp bệnh nhân không được kiểm soát tốt với các thuốc điều trị hen suyễn khác (ví dụ: khi dùng liều thấp đến trung bình corticosteroid dạng hít) hoặc bệnh nhân bị hen nặng lên một cách rõ ràng khi đã điều trị duy trì với 2 liệu pháp điều trị. Không dùng Formonide Inhaler cho bệnh nhân hen phế quản đã được kiểm soát tốt với corticosteroid dạng hít và chất chủ vận beta-2 dạng hít tác dụng ngắn.

✓ Chống chỉ định:

Không dùng cho bệnh nhân điều trị ban đầu tình trạng hen suyễn hoặc các biểu hiện cấp tính của bệnh hen khi cần phải có các biện pháp cấp cứu. Quá mẫn (dị ứng) với budesonide, formoterol dạng hít.

✓ Liều lượng và cách dùng:

Liều dùng theo chỉ định của bác sỹ.

Liều khuyến cáo:

Dùng 2 lần hít/lần x 2 lần mỗi ngày (vào buổi sáng và buổi tối), chỉ dùng hít qua đường miệng. Súc miệng sau mỗi lần dùng thuốc. Nếu các dấu hiệu của bệnh hen phế quản đã được kiểm soát hoàn toàn với liều dùng khuyến cáo trên nên xem xét để giảm liều 1 lần/ngày.



TÀI LIỆU THAM KHẢO:

(1), (2), (3): Tài liệu hướng dẫn sử dụng thuốc

1 liều/lần
x 2 lần/ngày