


Derinide

BUDESONIDE 100 / 200

KHÁNG VIÊM HIỆU QUẢ TRONG HEN SUYỄN


Budesonide là một glucocorticosteroid đáp ứng

- Có hoạt tính kháng viêm tại chỗ cao⁽¹⁾
- Thời gian lưu lại các cơ ở đường hô hấp dài dù thời gian bán hủy ngắn⁽²⁾



- Nghiên cứu mô, ngẫu nhiên thực hiện trên mẫu mô phổi của 22 bệnh nhân bị cắt thùy hoặc toàn bộ phổi vì ung thư. Bệnh nhân được sử dụng 100mcg đơn liều Budesonide hoặc Fluticasone. Mẫu mô phổi được thu thập sau khi dùng thuốc 1-43 giờ.

- Budesonide oleate được phát hiện trong mẫu thử đầu tiên và kéo dài đến 43 giờ sau khi dùng thuốc.



**1 liều/ lần
x 2 lần/ ngày**

Tài liệu tham khảo:

- (1): Hướng dẫn sử dụng Budesonide
(2): Evidence of the invitro esterification of budesonide in human airways_ BJCP (British Journal of Clinical Pharmacology)

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản Lý Dược-Bộ Y Tế: .../.../QLD-TT, ngày ... tháng ... năm ...
In ngày ... tháng ... năm ...
Thông tin sản phẩm xem trang 2