

NHANH CHONG HET CON ĐAU DẠ DÀY, DỄ CHỊU DẠ DÀY



[Handwritten signature]
Ngày 11/2014

- **Tráng phủ dạ dày**
- **Vị bạc hà thơm mát**

Thuốc dạ dày Trimafort dạng sữa, phối hợp 3 thành phần, tráng phủ niêm mạc dạ dày, trung hòa acid dư giúp nhanh chóng giảm đau, giảm nóng rát và đầy hơi.

Thuốc dạ dày Trimafort nhanh chóng hết cơn đau dạ dày để bạn tập trung làm việc.



- Thành phần: mỗi gói (10ml) có chứa: Nhôm hydroxyd gel (13%): 3030,3mg (400mg Al₂O₃); Magnesi Hydroxyd: 800,4mg; Nhũ dịch simethicone 30%: 266,7mg (80mg Simethicone); Tã được: vừa đủ
- Liều dùng: Người lớn: uống 1 gói (10ml) / lần, uống 3 lần mỗi ngày, giữa các bữa ăn hoặc uống trước khi đi ngủ; Trẻ em: theo sự hướng dẫn của bác sĩ
- Chỉ định: tăng tiết acid dịch vị, ợ nóng, khó chịu ở dạ dày ruột, đầy hơi, buồn nôn, ói mửa, đau dạ dày, ợ hơi
- Chống chỉ định: bệnh nhân mắc cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân suy thận nặng. Không dùng thuốc này cho phụ nữ 3 tháng đầu thai kỳ
- Thận trọng: Thận trọng chung: Tuân theo chỉ định liều dùng và cách dùng. Nếu các triệu chứng không được cải thiện sau 2 tuần điều trị, ngưng dùng thuốc và tham vấn ý kiến bác sĩ hoặc được sĩ;
- Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân sau: Bệnh nhân rối loạn chức năng thận, bệnh nhân đang dùng thuốc khác
- Tác dụng ngoại ý: tiêu chảy, táo bón do thuốc hiếm khi xảy ra. Thông báo cho bác sĩ bất kỳ tác dụng ngoại ý nào xảy ra do dùng thuốc này
- Sử dụng ở phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em: phụ nữ có thai và cho con bú cần tham vấn ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng thuốc này. Trẻ em dưới 7 tuổi không được sử dụng thuốc này.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

- Nhà sản xuất: Daewoong Pharma. Co., Ltd., 906-10, Sangsin-Ri, Hyangnam - Myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
- Sổ Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: ____/____/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm; ngày ... tháng ... năm ... in tài liệu