

HƯỚNG DẪN PHA THUỐC

Thông tin cho dược sĩ: cần thêm vào 54 ml nước để pha thành 60 ml hỗn dịch uống.



Kiểm tra nắp chai thuốc phải còn nguyên vẹn và chưa mở trước khi sử dụng.

Một xy - lanh phân liều 5ml chia vạch đến 0.5ml có thể được cung cấp cùng với thuốc. Xy - lanh này còn kèm theo nắp nổi vừa khít với miệng chai.

Để lấy chính xác liều thuốc, làm theo các bước sau:

- Lắc chai thuốc
- Lắp nắp nổi vào miệng chai
- Lắp đầu xy - lanh vào nắp nổi
- Xoay ngược chai thuốc
- Kéo pittông lên để đo liều thuốc bạn cần
- Quay chai thuốc lại chiều xuôi, rút xy - lanh ra, để nguyên nắp nổi trên chai vào đóng nắp.

0 mg/5ml

0.5 ml *

08/12/2014



VN-17450-13

Chủ sở hữu số đăng ký: Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, CHLB Đức

Nhà sản xuất: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Áo

Nhà Xuất xưởng lô: Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee1, 39179 Barleben, Đức

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý dược - BYT: xxxx/xx/QLD - TT

ngày tháng năm

Ngày xx tháng xx năm xxxx in tài liệu

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở trang 2