

## TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Rx - Thuốc bán theo đơn

**Curam<sup>®</sup>** 250 mg/5ml  
Amoxicillin/acid clavulanic

**Curam**  
Amoxicillin/acid clavulanic

Amoxicillin 250 mg và acid clavulanic

### Amoxicillin 250 mg và acid clavulanic 62,5 mg/ 5 ml hỗn dịch

**Thành phần:** Hoạt chất: mỗi 5 ml hỗn dịch sau khi pha có chứa 287 mg amoxicillin trihydrate, tương ứng với 250 mg amoxicillin và 74,5 mg potassium clavulanate, tương ứng với 62,5 mg acid clavulanic. Các thành phần khác: Aspartame, guar gum, talc, trisodium citrate khan, silicon dioxide, acid citric khan, chất tạo mùi: chanh (chứa trong số những sorbitol khác (Ph.Eur), sulphur dioxide), mùi đào-mơ (chứa trong số những sorbitol khác (Ph.Eur), sulphur dioxide), mùi cam.

**Dạng bào chế:** Dạng bột để pha hỗn dịch: bột màu trắng nhạt có mùi trái cây và mùi đặc trưng của hoạt chất.

**Qui cách đóng gói:** Hộp 1 chai thuốc chứa 7,5 g bột (dùng để pha 60 ml hỗn dịch).

**Chỉ định và điều trị:** Curam 250 mg/5 ml là một kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn là nguyên nhân gây nhiễm khuẩn. Thuốc gồm hai hoạt chất khác nhau là amoxicillin và acid clavulanic.

Curam 250 mg/5 ml được sử dụng cho trẻ nhỏ và trẻ em để điều trị các nhiễm khuẩn sau:

**Viêm tai giữa và nhiễm khuẩn xoang mũi; Nhiễm khuẩn đường hô hấp; Nhiễm khuẩn đường tiết niệu; Nhiễm khuẩn da và mô mềm bao gồm nhiễm khuẩn răng; Nhiễm khuẩn xương và khớp**

**LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:** Luôn sử dụng Curam 250 mg/5 ml theo như chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu không chắc chắn, nên hỏi lại bác sĩ hay dược sĩ. **Người lớn và trẻ em cân nặng từ 40 kg trở lên:** Dạng hỗn dịch này thường không được khuyến cáo cho người lớn và trẻ em > 40 kg. Hãy hỏi bác sĩ và dược sĩ. **Trẻ em cân nặng dưới 40 kg.** Tất cả các liều được tính toán dựa trên cân nặng của trẻ (kg). Bác sĩ sẽ khuyên nên dùng bao nhiêu Curam 250 mg/5 ml cho con của bạn. **Liều thông thường là 20 mg/5 mg/kg/ngày đến 60 mg/15 mg/kg/ngày, chia làm 3 lần/ngày.**

**Chú ý:** Để biết cách pha hỗn dịch, cách rút hỗn dịch thuốc và cách dùng thuốc chính xác, vui lòng xem thêm ghi chú ở cuối tờ hướng dẫn sử dụng.

**Bệnh nhân có các vấn đề về gan, thận:** Nếu trẻ có các vấn đề về thận, có thể điều chỉnh liều. Bác sĩ có thể cho sử dụng hàm lượng khác hay thuốc khác. Nếu trẻ có các vấn đề về gan, cần làm xét nghiệm máu thường xuyên để kiểm tra chức năng gan.

**Cách dùng Curam 250 mg/5 ml:** Cho trẻ uống hỗn dịch thuốc trước bữa ăn hay bữa ăn nhẹ trước đó. Dùng các liều trong một ngày cách đều nhau, ít nhất 4 giờ. Không uống 2 liều trong 1 giờ. Không cho trẻ dùng Curam 250 mg/5 ml quá 2 tuần. Nếu cảm thấy chưa khỏe, nên gặp lại bác sĩ. Luôn lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng. Bạn có thể bơm hỗn dịch thuốc trực tiếp vào trong miệng từ ống bơm phân liều hoặc dùng muỗng để uống thuốc. Trẻ cần phải ngồi thẳng khi uống thuốc trực tiếp vào trong miệng. Bơm thuốc ra chậm từ ống bơm phân liều tốt nhất là ở mặt trong má để trẻ không bị sặc. **Nếu sử dụng Curam 250 mg/5 ml quá liều khuyến cáo:** Nếu trẻ dùng quá nhiều Curam 250 mg/5 ml, có thể xảy ra cảm giác khó chịu ở dạ dày (nôn, buồn nôn, tiêu chảy) hay co giật. Báo cho bác sĩ ngay khi có thể. Hãy mang theo hộp thuốc hay chai thuốc đến gặp bác sĩ. **Nếu quên không dùng Curam 250 mg/5 ml:** Nếu quên cho trẻ uống 1 liều, hãy cho uống ngay khi nhớ ra. Không cho trẻ dùng liều tiếp theo quá sớm, chờ khoảng 4 giờ trước khi dùng liều tiếp theo. **Nếu ngưng dùng Curam 250 mg/5 ml:** Tiếp tục cho trẻ dùng Curam 250 mg/5 ml cho đến khi việc điều trị hoàn tất ngay cả khi trẻ cảm thấy khỏe hơn. Cần dùng hết các liều để giúp kiểm soát sự nhiễm khuẩn. Nếu vi khuẩn vẫn còn tồn tại, chúng có thể gây nhiễm khuẩn trở lại. Nếu cần thêm thông tin về cách sử dụng thuốc này, xin hỏi bác sĩ hay dược sĩ.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không cho trẻ dùng Curam 250 mg/5 ml khi: Trẻ bị quá mẫn (dị ứng) với amoxicillin, acid clavulanic, sulphur dioxide hay bất kỳ thành phần nào khác của thuốc. Trẻ đã từng có phản ứng dị ứng nặng (tăng nhạy cảm) với bất kỳ kháng sinh nào. Phản ứng dị ứng bao gồm mê đay, sưng mặt hay cổ. Trẻ đã từng có vấn đề về gan hoặc vàng da khi dùng kháng sinh. Không dùng Curam 250 mg/5 ml cho trẻ nếu có bất kỳ dấu hiệu nào nêu trên. Nếu không chắc chắn, báo cho bác sĩ hay dược sĩ trước khi cho uống Curam 250 mg/5 ml.

**CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG:** Hỏi bác sĩ hay dược sĩ trước khi cho trẻ dùng thuốc nếu: Trẻ bị bệnh Pfeiffer (sốt tăng bạch cầu đơn nhân do nhiễm trùng), trẻ đang được điều trị các bệnh về gan hay thận, trẻ không tiểu tiện thường xuyên (thiếu niệu). Nếu không

chắc chắn về các trường hợp trên, l  
dùng Curam 250mg/5ml. Trong m  
kiểm tra loại vi khuẩn gây nhiễm k  
được, trẻ có thể được điều trị với l  
thuốc khác.

**Thận trọng khi dùng:** vì Curam 250  
xấu đi hay gây ra các phản ứng phụ  
ứng, co giật và viêm đại tràng. C  
uống Curam 250 mg/5 ml để giảm t  
**Xét nghiệm máu và nước tiểu:**

NGHIỆM MÁU (như xét nghiệm tinh tr  
năng gan) hoặc xét nghiệm nước ti  
đang dùng Curam 250 mg/5ml. B  
hưởng đến kết quả các xét nghiệm

**Có thai và cho con bú:** Nếu bệnh r  
hoặc cho con bú, xin báo cho bác s  
hay được sĩ trước khi dùng bất kỳ t

**Ảnh hưởng lên khả năng lái xe**  
nghiên cứu nào được tiến hành về ả  
xe và vận hành máy móc. Tuy nhi  
có thể xảy ra (như phản ứng dị ứng  
hưởng đến khả năng lái xe và vận l  
**Thông tin quan trọng về một số t**  
Curam 250 mg/5 ml có chứa aspart  
nine và có thể gây hại cho trẻ bị b  
này có chứa sorbitol. Chỉ dùng Cui  
tham vấn bác sĩ nếu bạn biết rằng đ  
đường.

**TƯƠNG TÁC:** Thông báo cho bác s  
trẻ đang dùng hoặc đã dùng gần đ  
thuốc từ dược liệu. Nếu trẻ dùng t  
250 mg/5 ml, nhiều khả năng xảy r  
dùng Probenecid (trị gút), có thể c  
mg/5 ml. Nếu dùng chung với các th  
cần tiến hành thêm các xét nghiệm  
hưởng đến hiệu quả của methotrex  
các bệnh thấp khớp).

**PHẢN ỨNG PHỤ:** Như các thuốc k  
ra các tác dụng phụ nhưng không p  
thận trọng với các phản ứng phụ sa  
**Phản ứng dị ứng:** Phát ban da, v  
nhìn thấy những đốm đỏ hay tìm tr  
đến các phản khác của cơ thể, sốt,  
hoặc ben, thỉnh thoảng có sưng mặt  
truy tìm mạch. Báo cho bác sĩ ngay  
như trên. Ngưng dùng Curam 250 m  
thường gây tiêu chảy mất nước  
và/hoặc có sốt. Báo cho bác sĩ ng  
nào như trên.

Phản ứng phụ rất thường gặp (> 1  
lớn). Phản ứng phụ thường gặp (< 1  
miệng hay ở các nếp gấp ở da, bị  
Dùng Curam 250 mg/5 ml trước khi  
(ở trẻ em).

Phản ứng phụ không thường gặp  
phát ban gia tăng, khó tiêu, chóng m  
Phản ứng phụ không thường gặp c  
tăng một số chất (enzym) do gan s  
1/1000): phát ban da, có thể phồng  
(đốm giữa sạm màu bao quanh bởi  
xung quanh gờ - ban đồ địa hình),  
ứng quá mẫn và co thắt cơ bắp  
hiệu nào ở trên, báo ngay cho bác s  
Phản ứng phụ không thường gặp c  
giảm số lượng tế bào tham gia vào  
bạch cầu.

**Nhà phân phối:** Công ty cổ phần dược liệu Trung Ương 2, 24 Nguyễn Thị Nghĩa  
**Mọi Chi Tiết xin liên hệ:** Toà nhà Centec, tầng 16, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai,