



VĂN PHÒNG DƯỢC SẮT KHUẨN BETADINE® - SẮT KHUẨN HIỆU QUẢ VẾT THƯƠNG NGOÀI DA
ĐẠI DIỆN THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
MUNDIPHARMA

Chỉ định: Dùng để sát khuẩn vết thương ngoài da. Dùng tại chỗ để sát khuẩn vết thương, có thể dùng để sát khuẩn rộng nhất so với mọi dung dịch sát khuẩn có giá trị. Không kích ứng, làm dịu da và niêm mạc. Không làm biến dạng da, quần áo. Những vùng bôi thuốc có thể được băng bó hoặc phủ băng lớp chất dẻo mà không mất hiệu lực của thuốc hoặc không làm tổn thương da. **Chỉ định:** Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc. Ngăn ngừa nhiễm trùng vết thương sau khi phẫu thuật. Dự phòng nhiễm khuẩn khi bong, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tưa miệng, chốc lở, herpes simplex, zena. Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ. Tiết không tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ. **Cách dùng và liều dùng:** Phết dung dịch thuốc pha loãng dần đều vào nơi cần điều trị. Sau khi để khô, hình thành một lớp phim thông khí, dễ rửa sạch bằng nước. Có thể bôi nhiều lần trong ngày. Sau 2-5 ngày dùng thuốc đều đặn mà triệu chứng bệnh không cải thiện: hỏi ý kiến bác sĩ. **Chống chỉ định:** Không dùng thuốc khi mẫn cảm với iod hoặc povidone hoặc có sự hoạt động quá mức của tuyến giáp, các bệnh lý khác của tuyến giáp, trước và sau khi trị liệu iod phóng xạ; trước khi làm nháy mắt, tiếp xúc với iod phóng xạ hoặc điều trị iod phóng xạ trong ung thư biểu mô tuyến giáp. **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:** Chỉ dùng tại chỗ. Ngưng dùng thuốc khi gặp kích ứng da, viêm da tiếp xúc hoặc mẫn cảm. Không làm nóng thuốc trước khi bôi. Dùng liều tối thiểu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do nguy cơ cao về tăng năng tuyến giáp. Tránh tuyệt đối để trẻ nhỏ nuốt thuốc vào bụng. Giữ xa tầm tay trẻ em. **Phụ nữ có thai và cho con bú:** Chỉ dùng khi có chỉ định chặt chẽ với liều tối thiểu do có sự tăng mẫn cảm iod. Không nên dùng liều cao Povidone-iod trong thời kỳ mang thai và cho con bú vì iod có thể ngấm vào nhau thai và tiết vào sữa mẹ, tương đương như trong huyết thanh, gây ra thiếu năng tuyến giáp thoáng qua với việc tăng hoặc mẫn cảm kích thích tuyến giáp ở thai nhi, trẻ sơ sinh. **Tác dụng phụ và phản ứng có hại:** Hiếm khi xảy ra phản ứng mẫn cảm da; có thể xuất hiện dưới dạng ngứa, ban đỏ, vết bong gộp nhỏ hoặc các biểu hiện tương tự. Rất hiếm khi xảy ra các phản ứng dị ứng toàn thân cấp tính (hạ huyết áp, vã/ hoặc khó thở). Điều trị dài ngày có thể dẫn đến hấp thu iod rõ rệt. Cá biệt, bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tuyến giáp có thể tiến triển tăng năng tuyến giáp, mạch nhanh. Sau khi hấp thu lượng lớn các sản phẩm có iod, thấy xuất hiện mất cân bằng điện giải, suy chức năng thận. **Nhà sản xuất:** Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13, Othellos str., Dhali Industrial Zone, P.O. Box 23661, 1685 Nicosia, Cyprus. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**



Thông tin sản phẩm xin liên hệ: VPBD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd
tại TPHCM, ĐT: (08) 73001299.
© : BETADINE đã được đăng ký nhãn hiệu

6/14/20
[Signature]



ion
®