



BỔ SUNG VITAMIN NHÓM B, VITAMIN C, CANXI, MAGIÊ VÀ KẼM



Thành phần: Berocca® Performance có 8 vitamin nhóm B (B1, B2, B6, B12, B3, B5, B8, B9), vitamin C, Canxi, Magiê và Kẽm. **Chỉ định:** Phòng ngừa và bổ sung trong các tình trạng tăng nhu cầu hoặc tăng nguy cơ thiếu hụt các vitamin nhóm B, vitamin C, Canxi, Magiê và Kẽm như: khi bị stress sinh lý, mệt mỏi, khó chịu, mất ngủ... **Cách dùng:** 1 đến 2 viên mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc. **Chống chỉ định:** Dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc. Tăng Canxi huyết, tăng Magiê huyết. Không nên dùng Vitamin C cho bệnh nhân tăng oxalate niệu, giảm chức năng thận hoặc thiếu hụt men glucose-6-phosphate dehydrogenase. **Thận trọng:** Không vượt quá liều khuyến cáo. Quá liều cấp và mãn tính làm tăng nguy cơ gây ra các tác dụng phụ. Nên tư vấn bác sĩ khi đang sử dụng bất kỳ thuốc nào khác, đang trong chế độ ăn hạn chế hoặc đang điều trị y tế. Nên uống cách các thuốc khác 4 giờ trừ trường hợp đặc biệt. Thuốc có thể ảnh hưởng đến xét nghiệm đo đường huyết, làm tăng hấp thu sắt, Vitamin C có thể ảnh hưởng đến xét nghiệm đo đường huyết, làm tăng hấp thu sắt, BN thừa Sắt nên thận trọng khi sử dụng. Quá liều Vitamin C ở BN thiếu hụt men glucose-6-phosphate dehydrogenase có thể liên quan tới thiếu máu tan huyết. Không dùng để điều trị thiếu hụt Vitamin B12. BN phenylketon nên tránh các sản phẩm chứa aspartame. Sản phẩm chứa muối, nên cân nhắc ở BN có chế độ ăn hạn chế muối. **Tác dụng không mong muốn:** Tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau bụng và đau dạ dày ruột, táo bón. Phản ứng dị ứng, phản ứng phản vệ, sốc phản vệ. Các phản ứng quá mẫn gồm hội chứng hen, các phản ứng nhẹ đến trung bình ảnh hưởng lên da, và/hoặc đường hô hấp, đường tiêu hóa, và/hoặc hệ tim mạch. Các triệu chứng này có thể gồm phát ban, mề đay, phù, ngứa, rối loạn tim hô hấp, và các phản ứng nghiêm trọng gồm sốc phản vệ. Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, căng thẳng có thể xuất hiện. Màu sắc nước tiểu: có thể thấy nước tiểu đổi màu vàng nhẹ. Ảnh hưởng này không có hại và do thành phần Vitamin B2 có trong thuốc. *Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.* **Nhà sản xuất:** PT. Bayer Indonesia Jl. Raya Bogor, Km 32 Depok, 16416, Indonesia. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: xxx/xx/QLD-TT, ngày.....tháng.....năm.....Ngày.....tháng.....năm..... in tài liệu. Mọi chi tiết về sản phẩm xin liên hệ: Tel: (08)38450828 – Fax: (08)39979209

VN.BCC.NUT.BER.2014.10.24.03