




daflon® 500mg

Phân đoạn Flavonoid vi hạt tinh chế

GIẢM TRIỆU CHỨNG

GIẢM PHỤ

N788 / 43/16114



(1) RELIEF - Jantet G, Angiology 2002, 53, 245:256: Nghiên cứu quốc tế, tiếp cứu, đa trung tâm ở 23 quốc gia.

MỤC TIÊU: 1: Thống kê dữ liệu đa quốc gia về suy tĩnh mạch mạn tính. 2: Đánh giá tiến triển triệu chứng và dấu hiệu liên quan suy tĩnh mạch mạn tính có kèm hoặc không kèm trào ngược tĩnh mạch trước và sau điều trị với MPFF: Micronized purified flavonoid fraction - phân đoạn flavonoid tinh chế dạng vi hạt (trong đó bao gồm Daflon 500mg). 3: Thiết lập bảng hỏi đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính trước và sau điều trị với MPFF - Micronized purified flavonoid fraction - phân đoạn flavonoid tinh chế dạng vi hạt (trong đó bao gồm Daflon 500mg).

(2) EDET - Phlebolympology.2010; 17(3): 137-143: Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả làm giảm chu vi và thể tích cẳng chân khi điều trị với Daflon 500mg, 2 viên / ngày trong 6 tháng trên 215 bệnh nhân suy tĩnh mạch mạn tính phân độ C3_g.

(*) Điểm số triệu chứng được đánh giá thông qua thang điểm đau VAS (visual-analog-scales). Thang điểm đi từ 0 cm (không đau) đến 10 cm (đau không chịu đựng được).