

KLACID® SUSPENSION 60ml
Clarithromycin 125mg/ 5ml

LỰA CHỌN HIỆU QUẢ
TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP ⁽¹⁾



Hướng dẫn sử dụng ⁽¹⁾

Bước 1: Đổ nước sôi để nguội hoặc nước tinh khiết vào lọ thuốc đến ngang vạch đỏ

Bước 2: Lắc đều chai thuốc để hạt cốm phân tán đều trong nước (Không cần lắc quá mạnh vì đây là dạng hỗn dịch, nên hạt cốm sẽ không tan trong nước mà chỉ phân tán đều)

Bước 3: Tiếp tục thêm nước đến ngang vạch đỏ, Thuốc và nước sau khi pha tạo thành hỗn dịch có nồng độ clarithromycin là 125mg/5ml có hương thơm trái cây thích hợp cho trẻ em

Bước 4: Sử dụng ống đong kèm theo để lấy thuốc cho bé uống theo bảng hướng dẫn chia liều

Bước 5: Sau khi lấy thuốc, đóng kín nắp bảo quản ở nhiệt độ phòng (15°C- 30°C). Thuốc đã pha xong có thể dùng trong 14 ngày. Không cần bảo quản trong tủ lạnh. Lắc trộn đều hỗn dịch trước khi sử dụng.

Liều dùng

Liều dùng 7,5mg/kg
 (tương đương 0.3ml/kg cân nặng)
 x 2 lần/ngày x 5-10 ngày

Trọng lượng Kg	Liều dùng chuẩn (ml), dùng ngày 2 lần
8-11	2,5
12-19	5,0
20-29	7,5
30-40	10,0


Handwritten signature and date: 26/12/2013



Đổ nước sôi để nguội hoặc nước tinh khiết

Vạch đỏ

Lắc để trộn đều hỗn dịch



Sử dụng ống đong kèm theo để lấy thuốc cho bé uống



Mẹ nhỏ giúp bé uống thuốc dễ dàng hơn

- Có thể cho bé uống Klacid® Suspension cùng với sữa hoặc uống kèm với bữa ăn. Sau khi uống thuốc cho bé uống thêm nước lọc tráng miệng để không còn cảm giác lợn cợn và để trẻ không nhai vỡ các hạt cốm còn sót trong miệng có thể gây đắng.

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản Lý Dược- Bộ Y Tế XXXX/XX/QLD-TT, ngày... tháng... năm
 Ngày in tài liệu: / / Thông tin chi tiết của sản phẩm xin xem ở trang 2-3-4-5

Abbott
 A Promise for Life