




MELOXICAM: GIẢM TÌNH TRẠNG ĐAU KHI DI CHUYỂN DO THOÁI HÓA KHỚP^(2,3*)



MELISSA: Nghiên cứu mù đôi, tiến cứu, giả đôi, ngẫu nhiên, quy mô lớn trên 27 quốc gia. Bệnh nhân thoái hóa khớp được chỉ định meloxicam 7,5 mg hoặc diclofenac 100 mg SR mỗi ngày một lần, trong 28 ngày.


SELECT: Nghiên cứu mù đôi, tiến cứu, giả đôi, ngẫu nhiên, hai nhóm song song, quy mô lớn trên 12 quốc gia. Bệnh nhân thoái hóa khớp được chỉ định meloxicam 7,5 mg hoặc piroxicam 20 mg mỗi ngày một lần, trong 28 ngày.

Tiêu chí đánh giá là tình trạng đau khi di chuyển và đau khi nghỉ trong hai nghiên cứu được đánh giá bằng giá trị trung bình theo thang điểm VAS tại thời điểm bắt đầu và kết thúc điều trị.

VAS (Visual Analog Scale) là thang điểm đánh giá đau tính bằng mm, trong đó 0 mm: không đau, 100 mm: đau dữ dội.

08/4/2014

MELOXICAM: GIẢM TÌNH TRẠNG CỨNG KHỚP DO THOÁI HÓA KHỚP^{4(*)}



Nghiên cứu đa trung tâm, mù đôi, giả đôi, nhóm song song trên 774 bệnh nhân thoái hóa khớp gối và khớp háng được phân nhóm ngẫu nhiên và điều trị với meloxicam (7,5 mg/1 lần/ngày hoặc 15 mg/1 lần/ngày), diclofenac (50 mg/2 lần/ngày) hoặc placebo.

Tiêu chí chính để đánh giá hiệu quả của thuốc bao gồm chỉ số WOMAC, đánh giá tổng thể tình trạng đau của bệnh nhân, đánh giá tổng thể của bệnh nhân và bác sĩ về mức độ hoạt động của bệnh.

Chỉ số WOMAC (the Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis): được dựa vào thang đo Likert cho phép bệnh nhân tự đánh giá tình trạng bệnh. Đánh giá bao gồm 3 phân nhóm (đau, cứng khớp và chức năng vận động) và tổng điểm (từ 0 [tốt nhất] đến 96 [tệ nhất]).



Boehringer
Ingelheim

(*) Thông tin này chỉ dùng để tham khảo