





MELOXICAM: HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP ^{5(*)}



Nghiên cứu tiến cứu, mù đôi, đa trung tâm, đối chứng với giả dược trong 6 tuần, sau đó mở rộng nghiên cứu đến 1 năm trên bệnh nhân viêm cột sống dính khớp. Bệnh nhân được chỉ định meloxicam 15 mg/ngày hoặc piroxicam 20 mg/ngày hoặc placebo. Tiêu chí đánh giá chính bao gồm: (a) Đánh giá toàn diện của bệnh nhân về mức độ hoạt động của bệnh, đánh giá bằng thang điểm VAS; (b) Mức độ đau trong 2 ngày trước đánh giá bằng thang điểm VAS; (c) Suy giảm chức năng, đánh giá bằng chỉ số ASFI (Ankylosing Spondylitis Functional Index).

08/4/2014

MELOXICAM: HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP ^{6(*)}



Nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, giả đôi, nhóm song song, đa trung tâm trong 12 tuần trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp được chỉ định meloxicam 7,5 mg hoặc 15 mg (1 lần/ngày) so với placebo và diclofenac 75 mg (2 lần/ngày) để đánh giá hiệu quả và tính an toàn của meloxicam trong điều trị viêm khớp dạng thấp. Đánh giá đáp ứng điều trị được thực hiện ở tuần thứ 2, 4, 8 và 12. Giá trị trung bình của tất cả các đánh giá về điều trị (thể hiện bằng diện tích dưới đường cong - AUC) được dùng để đánh giá sự thay đổi tình trạng đau và sưng khớp so với trước khi điều trị.