





MELOXICAM: CẢI THIỆN ĐỘ DUNG NẠP TRÊN ĐƯỜNG TIÊU HÓA ^{2,7(*)}



MELISSA: nghiên cứu mù đôi, tiền cứu, giả đôi, ngẫu nhiên, quy mô lớn trên 27 quốc gia. Bệnh nhân thoái hóa khớp được chỉ định meloxicam 7,5 mg hoặc diclofenac 100 mg SR mỗi ngày một lần, trong 28 ngày. Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá sự dung nạp của thuốc. ^{2(*)}

Handwritten signature and date: 08/4/2014



Phân tích toàn cầu về tính an toàn từ các nghiên cứu lâm sàng của meloxicam, chủ yếu về các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Meloxicam 7,5 và 15 mg được so sánh với piroxicam 20 mg, diclofenac 100 mg phóng thích chậm và naproxen 750 - 1000 mg. Các nghiên cứu được thực hiện trên người tình nguyện khỏe mạnh, bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp và các bệnh lý khớp khác. ^{7(*)}



Boehringer
Ingelheim

(*) Thông tin này chỉ dùng để tham khảo