





CÁC DỮ LIỆU VỀ BIẾN CỐ THUYỀN TẮC HUYẾT KHỐI ^{8,9(*)}



Phân tích gộp trên 24196 bệnh nhân thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp từ 28 nghiên cứu lâm sàng. Đa số bệnh nhân được theo dõi đến 60 ngày để đánh giá các biến cố tiêu hóa trầm trọng (các biến cố được chọn theo bảng phân loại của WHO và sự thống nhất của hội đồng xét duyệt nghiên cứu) và biến cố huyết khối thuyền tắc (dựa trên đánh giá của người báo cáo). Phân tích về khả năng tích lũy các biến cố được thực hiện bằng phương pháp ước đoán Kaplan-Meier. ^{8(*)}

[Signature]

08/4/2014



Tần suất biến cố thuyền tắc do huyết khối được báo cáo từ dữ liệu theo dõi biến cố kèm theo việc kê toa (PEM) tại Anh quốc trong 9 tháng. Các bệnh nhân được bác sĩ đa khoa kê toa meloxicam và celecoxib. Ít nhất 6 tháng sau khi khởi đầu điều trị cho mỗi bệnh nhân, bác sĩ được yêu cầu cung cấp thông tin qua một bảng trả lời câu hỏi khảo sát về chi tiết các biến cố xảy ra trong và sau khi điều trị, các yếu tố nguy cơ (tuổi, giới tính, tình hình sử dụng NSAID trong vòng 3 tháng điều trị). Tần suất các biến cố đầu tiên được tính dựa trên tỷ lệ nguy cơ thô và sau hiệu chỉnh bằng phương pháp hồi quy Poisson. ^{9(*)}



Boehringer
Ingelheim

(*) Thông tin này chỉ dùng để tham khảo