


Cơ chế tác dụng ⁽¹⁾

- ✓ Tramadol và chất chuyển hóa hoạt tính M1 gắn kết với thụ thể μ -opioid
- ✓ Tramadol ức chế nhẹ sự tái hấp thu của Serotonin và Nor-epinephrin
- ✓ Paracetamol là thuốc giảm đau trung ương khác, cơ chế và vị trí tác động giảm đau chính xác chưa rõ ràng
- ✓ Sự phối hợp Tramadol và Paracetamol có tác dụng hợp lực khi đánh giá trên động vật thí nghiệm

Tramadol/Paracetamol khởi phát tác dụng trong vòng 17 phút ở bệnh nhân đau sau mổ hoặc nhổ răng hàm ⁽²⁾




Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, có nhóm chứng trên bệnh nhân đau sau mổ/mổ nhiều răng hàm, mức độ trung bình đến nặng

Thời gian khởi phát tác dụng được xác định bằng đồng hồ bấm giờ kép.

- Tramadol 37,5mg/Paracetamol 325mg (n=240)
- Tramadol 37,5mg (n=238)
- Paracetamol 325mg (n=240)

Tramadol/Paracetamol thời gian tác dụng kéo dài hơn 5 giờ ở bệnh nhân đau sau mổ hoặc nhổ răng hàm ⁽²⁾



Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, có nhóm chứng trên bệnh nhân đau sau mổ/mổ nhiều răng hàm, mức độ trung bình đến nặng

Thời gian tác dụng là thời gian từ lúc bắt đầu dùng thuốc đến lúc cần dùng thêm thuốc giảm đau

- Tramadol 37,5mg/Paracetamol 325mg (n=240)
- Tramadol 37,5mg (n=238)
- Paracetamol 325mg (n=240)