


Hiệu quả giảm đau ở bệnh nhân đau sau mổ hoặc nhổ răng hàm ⁽³⁾




Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, có nhóm chứng giả dược trên bệnh nhân đau sau nhổ/mổ nhiều răng hàm, mức độ trung bình đến nặng

Hiệu quả giảm đau được đánh giá tại thời điểm 30 phút, 1, 2, 3, 4, 5, 6 giờ.

- Tramadol 37,5mg/Paracetamol 325mg (n=153)
- Tramadol 50mg (n=152)
- Giả dược (n=151)

Hiệu quả giảm đau ở bệnh nhân đau sau phẫu thuật ⁽⁴⁾




Nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi trên bệnh nhân đau sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hay vùng bụng

- Tramadol/Paracetamol (n=98)
- Codeine/Paracetamol (n=109)
- Giả dược (n=98)

(*) Mức độ giảm đau theo thang điểm Likert 6 điểm (-1-4)

- 1: Đau hơn trước
- 0: Không giảm đau
- 1: Giảm đau nhẹ
- 2: Giảm đau khá
- 3: Giảm đau nhiều
- 4: Giảm đau hoàn toàn

Tác dụng ngoại ý ở bệnh nhân đau sau phẫu thuật ⁽⁴⁾



Nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi trên bệnh nhân đau sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hay vùng bụng

- Tramadol/Paracetamol (n=98)
- Codeine/Paracetamol (n=109)
- Giả dược (n=98)