



MomateTM-S



Thuốc mỡ Mometasone Furoate 0,1% và Salicylic Acid 5%

Vào ngày thứ 22, phần trăm cải thiện trung bình trong tổng điểm dấu hiệu bệnh⁽¹⁾

- Mometasone furoate - salicylic acid: 68.9%
- Mometasone furoate đơn trị liệu: 60.9%



Nghiên cứu đa trung tâm, song song, có đối chứng, ngẫu nhiên, mù đôi trên 408 bệnh nhân chia ra 2 nhóm so sánh hiệu quả và an toàn của thuốc mỡ phối hợp mometasone furoate 0,1% + salicylic acid 5% với thuốc mỡ mometasone furoate 0,1% đơn trị liệu (bôi 2 lần/ngày trong 21 ngày) trong điều trị vẩy nến dạng vừa đến nặng. Bệnh nhân phải có 3 dấu hiệu bệnh của vẩy nến (ban đỏ, chai cứng và tróc vẩy).⁽¹⁾

Tiêu chí đánh giá hiệu quả:

1. Phần trăm cải thiện so với ban đầu trên vết thương điều trị đo bằng tổng điểm dấu hiệu bệnh. Mức độ nặng của dấu hiệu bệnh được đánh giá khi bắt đầu điều trị và vào ngày 4, 8, 15, 22, sử dụng thang điểm từ 0 đến 3 (0 = không có, 1 = nhẹ, 2 = vừa, 3 = nặng).⁽¹⁾
2. Đáp ứng lâm sàng trên vết thương điều trị so với ban đầu. Tiêu chí này được đánh giá vào ngày 4, 8, 15, 22, sử dụng thang điểm 6 (1 = hết bệnh, 2 = cải thiện rất tốt, 3 = cải thiện tốt, 4 = cải thiện tương đối, 5 = ít cải thiện, 6 = bệnh nặng hơn).⁽¹⁾

Kết quả nghiên cứu được đánh giá trên tổng số 379 bệnh nhân ở ngày 4,8; 377 bệnh nhân ở ngày 15 và 383 bệnh nhân ở ngày 22.⁽¹⁾