



Fugacar®
Mebendazole 500mg

Liều 1 viên, diệt các loại giun
giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim

Fugacar chứa mebendazol dạng polymorph C, giúp tẩy giun hiệu quả!

VI SCOLIA, NHONG VI, VI TRAI CAY

Thành phần: Mỗi viên chứa 500 mg mebendazol
Chỉ định: Điều trị nhiễm một hay nhiều loại giun đường ruột: giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim
Liều dùng và cách dùng: 1 viên FUGACAR 500 mg duy nhất. Không cần áp dụng các cách đặc biệt như ăn kiêng hay dùng thuốc nhuận tràng.
Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với thuốc hoặc các tá dược của thuốc không dùng FUGACAR 500 mg cho trẻ dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai 3 tháng đầu và bệnh nhân suy gan.
Cảnh báo & Thận trọng: Thận trọng khi dùng Fugacar 500mg cho trẻ em dưới 2 tuổi. Trong giám sát hậu mãi, các cơn co giật ở trẻ em trong đó có cả trẻ dưới 1 tuổi được báo cáo và tần suất rất hiếm gặp. Chỉ nên sử dụng FUGACAR cho trẻ từ 1-2 tuổi nếu lợi ích tiềm tàng lớn hơn nguy cơ tiềm tàng về độc tính thần kinh trung ương và phát triển thần kinh của trẻ gây ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng nhiễm giun của trẻ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và phát triển thần kinh của trẻ. Để giảm nguy cơ biến chứng, nên cân nhắc dùng FUGACAR dạng viên nén, hiếm gặp những báo cáo về rối loạn tiêu hóa, nôn, buồn nôn, viêm gan, và giảm bạch cầu trung tính ở những bệnh nhân được điều trị với mebendazol. Dùng liều cao hơn mức liều được khuyến cáo và điều trị này cũng có thể hỗ trợ, viêm gan, và giảm bạch cầu trung tính trong các bệnh lý được chỉ định. Những biến chứng tiêu chuẩn trong các bệnh lý được chỉ định. Những biến chứng tiêu chuẩn trong các bệnh lý được chỉ định. Những biến chứng tiêu chuẩn trong các bệnh lý được chỉ định.
Phụ nữ có thai, cho con bú và khả năng sinh sản: Mebendazol có biểu hiện gây độc thai và quái thai ở chuột cống và chuột nhắt. Không nên dùng cho phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ và phụ nữ đang cho con bú. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng trên khả năng sinh sản cho thấy mebendazol không có ảnh hưởng lên khả năng sinh sản ở mức liều ≤ 10 mg/kg/ngày.
Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc: FUGACAR 500 mg không ảnh hưởng đến sự tỉnh táo và khả năng lái xe.
Tác dụng không mong muốn: xảy ra trong thử nghiệm lâm sàng ở < 1% bệnh nhân: khó chịu ở bụng, tiêu chảy, đầy hơi, phát ban. Tác dụng không mong muốn trong quá trình giám sát rất hiếm gặp: giảm bạch cầu trung tính, quá mẫn bất ngờ, chóng mặt, đau bụng, viêm gan, bất thường xét nghiệm chức năng gan, hoại tử biểu bì nặng, viêm da dị ứng, hội chứng Stevens-Johnson, ngoại ban, phù mạch, mày đay, rụng tóc. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Sản xuất tại: OLC (Thailand) Ltd.
Địa chỉ: 166 Moo 16 Bangpa-In Industrial Estate, Udonrath Road, Bangpa-In District, Ayutthaya Province, THAILAND
Công ty đăng ký: JANSSEN-Cilag Ltd., Thái Lan
Mọi câu hỏi/Báo cáo tác dụng ngoại ý/Than phiền chất lượng sản phẩm xin liên hệ: VEDO Janssen-Cilag Ltd., TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 8 39214828
Email: jacyndrugssafety@its.jnj.com

13/7/2015

janssen

MẶT SAU