

Fugacar®

Mebendazole 500mg

Liều 1 viên, diệt các loại giun
giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim



VỊ SOCOLA



KHÔNG VỊ



VỊ TRÁI CÂY

Fugacar chứa mebendazol
dạng polymorph C,
giúp tẩy giun hiệu quả!



Thành phần: Mỗi viên chứa 500 mg mebendazol

Chỉ định: Điều trị nhiễm một hay nhiều loại giun đường ruột: giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim

Liều dùng và cách dùng: 1 viên FUGACAR 500 mg duy nhất. Không cần áp dụng các cách đặc biệt như ăn kiêng hay dùng thuốc nhuận tràng.

Chống chỉ định: quá mẫn cảm với thuốc hoặc các tá dược của thuốc. Không dùng FUGACAR 500 mg cho trẻ dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai 3 tháng đầu và bệnh nhân suy gan.

Cảnh báo & Thận trọng: thận trọng khi dùng Fugacar 500mg cho trẻ em dưới 2 tuổi. Trong giám sát hậu mãi, các cơn co giật ở trẻ em trong đó có cả trẻ dưới 1 tuổi được báo cáo với tần suất rất hiếm gặp. Chỉ nên sử dụng FUGACAR cho trẻ từ 1-2 tuổi nếu lợi ích tiềm tàng lớn hơn nguy cơ tiềm tàng (ví dụ: nếu tình trạng nhiễm giun của trẻ gây ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng dinh dưỡng và phát triển thể chất của trẻ). Để giảm nguy cơ nghẹn, nên cân nhắc dùng FUGACAR dạng hỗn dịch uống cho bệnh nhân như trẻ nhỏ không thể nuốt dạng viên nén. Hiếm gặp những báo cáo về rối loạn chức năng gan có thể hồi phục, viêm gan, và giảm bạch cầu trung tính ở những bệnh nhân được điều trị với mebendazol ở liều chuẩn trong các bệnh lý được chỉ định. Những biến cố này cùng với viêm thận - tiểu cầu thận cũng được báo cáo khi sử dụng liều cao hơn mức liều được khuyến cáo và điều trị trong thời gian kéo dài. Nên tránh sử dụng đồng thời mebendazol với metronidazol vì có sự gợn ý về khả năng có mối liên hệ giữa Stevens-Johnson/hoại tử nhiễm độc biểu bì với việc sử dụng đồng thời mebendazol và metronidazol.

Phụ nữ có thai, cho con bú và khả năng sinh sản: Mebendazol có biểu hiện gây độc thai và quái thai ở chuột cống và chuột nhắt. Không nên dùng cho phụ nữ mang thai,

đặc biệt trong 3 tháng đầu

thai kỳ và phụ nữ đang cho con bú.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng trên khả năng sinh sản cho thấy mebendazol không có ảnh hưởng lên khả năng sinh sản ở mức liều ≤ 10 mg/kg/ngày.

Ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc: FUGACAR 500 mg không ảnh hưởng đến sự tỉnh táo và khả năng lái xe.

Tác dụng không mong muốn: xảy ra trong thử nghiệm lâm sàng ở <1% bệnh nhân: khó chịu ở bụng, tiêu chảy, đầy hơi; phát ban. Tác dụng không mong muốn trong quá trình hậu mãi: rất hiếm: giảm bạch cầu trung tính; quá mẫn bao gồm phản ứng phản vệ và phản ứng giống phản vệ; cơn co giật, chóng mặt; đau bụng; viêm gan, bất thường xét nghiệm chức năng gan; hoại tử biểu bì nhiễm độc, hội chứng Stevens-Johnson, ngoại ban, phù mạch, mày đay, rụng tóc. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Độc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sản xuất tại: OLIC (Thailand) Ltd.

Địa chỉ: 166 Moo 16 Bangpa-In Industrial Estate, Udomsorayuth Road, Bangpa-In District, Ayutthaya Province, THAILAND

Công ty đăng ký: JANSSEN-CILAG Ltd., Thái Lan

Mọi câu hỏi/Báo cáo tác dụng ngoại ý/Than phiền chất

lượng sản phẩm xin liên hệ:

VPĐD Janssen-Cilag Ltd., TP Hồ Chí Minh

ĐT: +84 8 38214828

Email: jacvndrugsafety@its.jnj.com

janssen

2

Code: