


Acabrose

Viên nén

Acarbose 50mg



Thuốc ức chế α -glucosidase

THÔNG TIN KÊ TOA

24/01/2014

THÀNH PHẦN

Mỗi viên chứa

Acarbose.....50 mg

Tá dược.....Vừa đủ 1 viên

DƯỢC LÝ

Dược lý học

Acarbose là một chất ức chế enzyme α -glucosidase dùng đường uống, được sử dụng để kiểm soát bệnh tiểu đường tuýp 2. Acarbose là một oligosaccharide lấy được từ quá trình lên men của một loại vi khuẩn *Actinoplanes utahensis*.

Dược động học

Sau khi uống, chỉ có 1 - 2% acarbose được hấp thu, sau đó thải trừ qua thận trong vòng 96 giờ.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc được khuyến nghị để điều trị bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin (NIDDM) ở các bệnh nhân không kiểm soát được đầy đủ chỉ với chế độ ăn kiêng, hoặc ăn kiêng và thuốc tiểu đường dạng uống.

LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG

Khởi đầu 50 mg x 3 lần/ngày, nếu cần tăng lên 100 mg x 3 lần/ngày, tối đa 200 mg x 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tình trạng quá mẫn cảm với acarbose và/hoặc các thành phần khác của thuốc. Bệnh viêm ruột, nghẽn một phần ruột, suy gan nặng, suy thận nặng, có thai và cho con bú.

THẬN TRỌNG

Acarbose phối hợp với sulfonylurea hoặc insulin sẽ làm hạ thêm đường huyết. Không xảy ra hạ đường huyết ở bệnh nhân chỉ dùng metformin trong các trường hợp sử dụng bình thường, và tỷ lệ hạ đường huyết không tăng lên ở các bệnh nhân dùng thêm acarbose với trị liệu metformin.

Khuyến cáo kiểm tra mức độ hemoglobin được glycosyl hóa khi kiểm soát đường huyết dài hạn. Dùng acarbose liều trên 50 mg x 3 lần/ngày có thể làm tăng transaminase huyết thanh, một số hiếm trường hợp có thể tăng bilirubin huyết. Nên kiểm tra transaminase huyết thanh mỗi 3 tháng trong năm đầu tiên điều trị bằng acarbose và kiểm tra định kỳ sau đó. Nếu tăng transaminase, có thể chỉ định giảm liều dùng hoặc ngưng điều trị, đặc biệt là khi tình trạng này kéo dài. Nồng độ huyết thanh của acarbose ở các người tình nguyện suy thận tăng tỷ lệ theo mức độ rối loạn chức năng thận. Vì thế, không nên dùng acarbose cho những bệnh nhân này.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Các chất hấp phụ trong ruột và các enzyme tiêu hoá có thể làm giảm tác dụng của Acarbose, vì thế không nên sử dụng đồng thời.

Cholestyramine có thể làm tăng tác dụng của Acarbose, nên tránh sử dụng cùng lúc.

LÁI XE & VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không có tác động nào được báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Thường bị đầy bụng và tiêu chảy, đau bụng, hiếm khi buồn nôn.

Thông báo cho thấy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Acarbose có chống chỉ định ở phụ nữ có thai và cho con bú.

QUÁ LIỀU & XỬ LÝ

Dùng quá liều acarbose không gây hạ đường huyết.

Dùng quá liều acarbose có thể làm tăng nhẹ đầy bụng, tiêu chảy và khó chịu ở bụng, sẽ bớt sau thời gian ngắn. Trong trường hợp dùng quá liều, bệnh nhân không nên uống hay ăn các loại carbohydrate (polysaccharide, oligosaccharide và disaccharide) trong vòng 4 - 6 giờ.

BẢO QUẢN

Bảo quản dưới 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

SỐ ĐĂNG KÝ

VN-9858-10

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn cơ sở

TRÌNH BÀY

Hộp 100 viên (10 vỉ x 10 viên)

SẢN XUẤT BỞI

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

Nhà máy

Địa chỉ: 6-20 Tu-Ku Li, Hsin-Ying, Tainan, Taiwan

ĐT: +886-2-2523 6641 Fax: +886-6-636 1516

Văn phòng đại diện

Địa chỉ: Lầu 8, Số 1119, Trần Hưng Đạo, P. 5, Q. 5, Tp. HCM

ĐT: +848-39246-882 Fax: +848-39246-881

Website: www.standard.com.tw

